


農葉信箱



樹果

栗樹嫁接困難 需有熟練技術

【問】：(一)「栗」的果實，在本省海拔一、五〇〇公尺以上能種植，據說在阿里山有栽植，是否野生栗？是否確實有？

(二)嫁接「栗」的砧木可用「茅栗」是何處可以採的？或除茅栗砧木之外，還有何種別可當作砧木？

(三)嫁接「栗」在於北部來言，適於何時期？嫁接是採用何種方式？切接、靠接、芽接那種的成活率強？

(四)「栗」的果實收穫期在甚麼時期？(新竹縣新埔鎮中正路三七四號劉漢榮)

【答】：(一)栗在本省高冷地均可栽植，惟應選避風及不太過濕之地，阿里山栽培情形不詳，和平、仁愛二鄉生長良好。

(二)栗之嫁接砧木多採自生苗，通常以切接法及劈接法行之。栗之嫁接比較一般果樹為困難，須有熟練之技術與經驗始得百分之四十到五十的成活率。

(三)插枝不易生根，歷條如實施澆水含宜，有百分之二十之希望，經苗圃保養一年後，始可定植。

(四)收穫期分早中晚品種而不同，現無記載資料。(栗鴻蘭)

注意栽培管理 增加果實產量

【問】：(一)六年生橫山梨有的在十月十一月開花結少數早生果，至翌年二、三月就不再開花結果，若將所結之果粒全部摘除不

知二、三月可能再開花結果否？

(二)有的梨樹於十一月十二月間樹葉被毛蟲食光，翌年二月三月就開花結果，同時若無落葉之梨樹在同年十一月十二月將所有之老葉全部摘除光不知翌年二、三月可能開花結果否？

(三)近常開柑桔數次噴射硫酸銨後柑果就不會酸，可能提早採收，但是噴射後對於柑樹及果粒有何影響？損益如何？或有其他必要之處理方法否？

(四)樣果追熟法一般說來以電石處理但尚有帶酸味而且很淡，獨有一果農為果販所處理之樣果不會酸，自然甜度比較強，不知是用何方法或者用何藥劑？因他求亦不公開。

(五)荔枝開花期與果販契約由果農自己噴射藥劑者落果嚴重，契約由果販自己噴射藥劑者就結果很多如龍眼一樣，到底用何藥劑有如此之強效？

(六)柑桔開花期要防止柑桔落果使其着果，有很多人說除草劑二、四—D有效，但其使用時期及倍數若干？效果如何？以一合錢之藥劑需要配合多少之清水？算作若干倍？(臺東卑南岩灣新村劉明生)

【答】：(一)臺灣平地種植一般梨樹，均有一年兩次果的習性，通常叫冬果、夏果。冬果一秋季開花，五、六月間成熟，夏果一二三月開花至八、九月間成熟，如果樹勢不強，產量不多，能控制秋花，自然增產夏果。

(二)按正常情形到十二月間，葉片自然脫落，如果不脫落，必是環境避風或施用氮肥過多之故，應注意加施磷鉀肥料，或可較前增產。

(三)未開柑果噴硫酸銨後會有不酸之事實，其影響未詳。

(四)樣果貯藏法，請參考豐年第十五卷第六期第十五頁。樣果之追熟也是一種技術經驗，同時選用品種不同，也是原因之一。

(五)荔枝落果原因約有二種，一種是生理落果，多在幼果期，另一種是蟲害落果，自發育至成熟期中均有落果，尤其是接近成熟期中為多。

草 的 殺 水 田 農藥界歷史優久...世界聞名



農藥登記證 346 號
商標註冊證 15695, 15272 號

正式獲准由日本原裝進口
即將大量供應

- ※1.促進節堅韌，防止稻穗倒伏
- 2.對於稻熱病紋枯病增加抵抗力
- 3.設草後變成植物荷爾蒙能促進作物生長，可提早收成並提高品質及產量
- ※第一期作...插秧後30日~37日使用
- 第二期作...插秧後22日~27日使用
- 說明書函索即寄 請付郵票一元

石原產業株式會社

總代理：大豐農藥股份有限公司

臺北市永綏路八號 電話34703·37831

現貨供應處：臺灣吉本農化企業社

臺中市西區柳川西路152號

* 新到貨 *

盧 筍 種 子
初 秋 甘 藍
濱 綠 包 心 白 菜

美國 BURBANK 公司原裝罐裝
美國 DUNSMITH 公司原裝罐裝
美國華盛頓五〇〇九號盧筍子
日本タキイ種苗株式會社
●長崎交配初秋甘藍
●日本サカタ種苗株式會社
●坂田交配濱綠包心白菜
●臺灣總代理 華 種 子 行
三市重新路二段三之一號
電話：九七二七四九號
郵政劃撥金一三五七一號
和 捷 發 行
和美鎮中山街64號電話29號

本刊廣告價目

封面全頁(二色) 四十九百元
封面裏全頁 四十四百元
封底裏全頁 四十元
正文第一頁全頁 三十八百元
正文內頁全頁 三十五百元
正文內頁半頁 一千九百元
正文內頁四分之一頁 一千四百百元
正文內頁六分之一頁 一千零五十元
正文內頁八分之一頁 七百五十元
正文內頁八分之一頁 六百元
小廣告 每行十元，超過二十行部份 每行二十元。