

其防治方法有二種：①套袋：在果實採取前一個月為最佳，②藥劑：以五〇％「力拔山」乳劑及五〇％「連滅松」乳劑，一千倍稀釋液，於落花後二十天左右開始噴射（約五月上旬），每隔十天噴射一次，連續三、四次，防治效果可達九五％以上，較套袋者提早成熟一星期左右。

（二）四、防止柑落果有顯著效果，其方法將二、四、一〇稀釋七五〇（百萬分之一），於採收前八週及四週各噴一次，噴射宜用高壓噴霧器，均勻噴射於全樹之枝葉及果實。（栗鴻蘭）

花蓮山地適種甜橙

可以改接晚密西亞

【問】：本人五年前種有美國柑橙鳳梨，魯金剛各壹百株，現因結果情形很差，想高接晚密西亞，（註鳳梨、魯金剛實自彰化永靖新高種苗園，確木可能酸枯）高接以後會不會親和？會不會患高接病？（花蓮縣光復鄉大富村二九號陳清祥）

【答】：（一）甜橙品種「鳳梨」及「魯金剛」，除非前者抗潰瘍病力稍差，不適於強風地帶種植以外，花蓮縣之一般山地該適宜種植，結果量可居本省現有甜橙品種之冠。（二）鳳梨及魯金剛與晚密西亞間之親和良好，可改接。（翁仁祿）

晚密西亞實生苗

可做印子柑砧木

【問】：（一）利用已成熟的パレンシヤ落果種子，種為砧木以接甜印子橙或柑柑是否適宜？影響怎樣？

（二）印子種子，種為砧木以接甜印子橙或柑柑是否適宜？印子苗木其他有什麼作用？（彰化縣埔鹽鄉崑崙村彰水路八五號洪萬居）

【答】：（一）晚密西亞種子播出之實生苗，樹勢強壯可作印子柑、柑柑之砧木。

以晚密西亞實生苗作為砧木時，接穗部印子柑、柑柑之樹勢可較其他酸桔、廣東檸檬砧者為強，但幼枝之果實品質較差。

（二）印子種子所萌出之實生苗不適作為印子柑或柑柑之砧木，相互間之親和力甚差，不但影響接穗部之生長，且易使接穗子葉黃化。印子種子僅可作文旦或其他柑類之砧木。（翁仁祿）

卉花

本省茉莉花栽培 集中臺北新竹地區

【問】：（一）截止目前為止，本省茉莉栽培面積及產量各有多少？

（二）一分地栽植之株數、株距、行距各多少？栽植適期是何時？

（三）品種有幾種？以何者為優？適於何種土壤，及氣候？

（四）施肥量、時期及方法如何？

（五）整枝與剪定之方法及時期如何？其他管理上需特別注意之問題怎樣？

（六）病蟲害之種類及發生時期、防治方法如何？

（七）何處有優良苗木？價格若干？

（八）臺灣「鹽酸草」（球根）有否除草劑可防治？（北市貴陽街二段二九巷一八號李信男）

【答】：（一）據五十五年農業年報，本省香花作物種植面積為一四、二一公頃，收穫面積為九〇、二〇公頃，產量一二八、六九三公斤，價值三、二一七、三二五元。惟其中包括黃枝、秀英、茉莉三種香花，故無法得知茉莉確實栽培面積，但至少有三十公頃以上。

（二）依行距一、三至一、五公尺，株距五〇、六〇公分種植，每公頃可植一二、八二〇株。三月中旬至四月移植最好。

（三）栽培品種有百葉種及六葉種二種。六葉種花朵較香，除沙性土外，其他土壤皆可種植，本省平地皆宜栽植。

（四）種植後三個月即可施稀薄人糞尿，以後可每月施肥一次，二年以後，應以人糞尿及大豆粕合用，可條施行間。

（五）無特殊整枝方法，只須剪去過長者，枝梢枯死者，過密者，可隨時修剪。因茉莉植株矮小，應勤除草。

（六）病蟲害甚少，介壳蟲及黑煤病經常可


東海牌動力噴霧、灌水兩用機

日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高

附三菱牌單相馬達
一馬力及附屬品，
亦可調換汽油引擎
使用。

重量：17kg
送水量：噴霧每
分29公升
灌水每分
53公升



優點：

- ①24小時繼續使用不損機件。
- ②抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
- ③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
- ④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。

岡恒老牌

天下一品

赤白ビニール卷

現貨供應



採果鉗 剪定鉗 接木刀 剪剪鉗

總經理 新高貿易股份有限公司 臺北市峨嵋街68號 電話：34190號



六畜興旺
增產報國



最新綜合飼料強化劑

- ◎健胃固腸，幫助消化，增進食慾。
（能助健康加速生長）
- ◎促進發育，可增加雞鴨產蛋質量。
（生長迅速增加產蛋率）
- ◎能預防廣範圍之疾病及治療之效果
（提高抵抗力減低死亡率）
- ◎強壯骨骼，提高產蛋率及孵化率。

中日合作

力必大工業股份有限公司

高雄市鼓山一路登山巷四號

Tel 56579 • 53895