

防治病蟲為害

留心噴洒農藥

在全面栽培時種植距離最好是六×八英尺，(也有人種五×六英尺)，如不希望下次再更新的麻煩，則其中可間作其他長壽命的果樹：如荔枝或芒果等，間作距離視其間作果樹的壽命而定，如此差不多五、六年後就有雙種果實可收了，等到番石榴衰老時砍掉留其他果樹。

爲了要有品質好，產量高而豐大的果粒，或減少肥樹採果的麻煩，所以必須當每枝新芽差不多長至八寸左右時就要摘心，(是指沒花蕾枝)，如有花蕾，一枝新芽最多能留四至六個，平常種植月枝一朵花蕾旁附帶二朵小蕾，也須摘掉，小蕾頂多能附帶一個，同時在一枝枝長很多芽的也須摘掉，而每個花蕾的襯葉也須摘掉，以減少蟲害增加，日光照射，可增甜度及品質。在兩次新芽間(一尺半左右)用鐵絲或竹片拉成水平。

施肥方法有兩種：(一)施化學肥料：每年分兩次在每季花果摘完八十%

用環溝法施下，用以促進早發新芽，以四年生的平均每株一次用氮三百公分，磷一百五十公分，鉀一百二十公分，株齡大小逐次增加。(二)水肥：行全年性的，以每半個月澆一次爲佳，因多施水肥可使果實豐滿，增加甜度，改良地質品質。如單施化學肥料，果實會帶澀味，而甜度低，顏色差，尤其在雨季裏會有未熟先果內黃的現象，所以水肥是不可缺少的。

番石榴最大的害蟲是果實蠅及捲心蟲，兩者皆可用「大滅速」或「美果素」防治，防治果實蠅是在收成前十五天至二十天噴霧才有效，防治捲心蟲是在開花新芽期。次之是木蠹蛾及星天牛，它會爲害樹幹，可用「地特靈粉劑」或乳劑加水，及石灰四倍調成泥狀在離地面至分枝間塗上，每年在四、五月間至冬至前各刷一次。番石榴水份非常重要，尤其在冬季裏必需充分灌溉，才不影響產量，同時在地面上覆上稻草或蔗葉或糠皮，如在雨季排水也重要，雖然不會浸死，但會使果實澀而無甜，未熟內黃。以上是本人的經驗。(南投鎮內興里大

孩童喜吃中山月拔(謝彰吉)



坤巷二號謝彰吉

注意選地整地定植

選擇園地：若於山地栽培番石榴，須海拔一〇〇〇公尺以下，坡斜較緩，表土深而肥沃者爲宜。平地栽培須排水良好，乾濕不嚴重者較佳，對任何土壤均可栽種。

整地：於平地栽種者宜做畦，畦種植於中央最高處，植位先挖穴寬七十公分，深五十公分。每穴加入十公斤左右的腐爛堆肥，與表土混合均勻後埋入穴中，盛土較畦高一一些而後澆水，使穴內土沉實，經一、二天後即可栽種。在山地栽種者穴應加大，約寬一公尺，深八十公分，多加一些堆肥，以後如平地方法處理就可。

定植：①種植時期全年均可，定植距離四公尺種三角形爲宜，每分地約需六十五枝。②種植時將包裝的稻草除去後種植，種植深度平地約蓋所帶的土柱上端三分公分，須植於畦中央最高處，山坡地或砂地約蓋土柱上端六公分。③植後充分澆水使根部與表土粒迅速密接，在葉未回復健康以前，要時常澆水，以保持濕度三十—四十度。④植後十五日發新根時始可施薄肥，繼續數次，待有新芽伸長健壯時才可施較濃的肥料。正常發育植後五—八個月即可使結果。


幼苗期的花果應全部摘葉，發育比較迅速。(基隆市中正區砂子里嶺後巷三號賴松如)

FILITAL

INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
FIRMAL GELLO ROMM AND HAAS COMPANY PHILADELPHIA


裝原斤公一利大意八十七生大

省農林廳農藥登記證第四八七號



ROHM AND HAAS PHILADELPHIA

PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19105 USA



省農林廳農藥登記證第一六一號

*大生二十二 美國三磅原裝

寄即索函書明說

售出有均行藥農地各省全

理代總濟台
司公限有易貿象青
 室一一七號四四一段一街口漢市北台
 七七一六三：話電

標商記登司公斯哈門羅城費州賓國美*