



作工備準栽移苗麻

# 值得倡導的黃麻育苗移栽法

· 季景元 · 許水田 ·

(續上期) ② 培育麻苗的圃地，在移栽前，應使含有適當水份，使土壤鬆軟，容易拔取，以免過度損傷根部，影響成活率。

③ 間拔時應選擇生長強健，莖徑肥粗，高度整齊，沒有病蟲害損傷的麻苗。萬一要用高度不一致的麻苗，也應在同區或同行，移栽同一高度的麻苗，使生長整齊，而免生長競爭，影響產量。

④ 拔苗時，要拿住靠近地面的根部拔起，以免折斷或頂芽受到任何損傷。

⑤ 麻苗五十株捆成一束，如以行距四十五公分移栽，每束可供二平方公尺之用；即每十公畝(一分地)需五百束麻苗。麻苗捆束部份，應在離梢部三分之一至二分之一近根部的地方，並且切勿緊繫，以免損傷。

⑥ 萬一拔除後一時來不及移栽，應將麻束解鬆，根部向下，放置陰涼處，或浸入淺溝，但在兩天

用大姆指和食指拿住根部，中指則靠近主根，略為伸出根端，和苗根同時插入土中，然後輕輕將中指抽起，擠壓周圍泥土，使和麻根充分接觸。根部插入土中深度，應和麻苗原來在地下部長度一樣。同行麻苗高度，必需整齊一致，免得小苗被大苗遮蔽，妨礙生長。如果糊仔移栽水稻行間，稻株有倒伏情形，要把鄰近的兩株稻稍，縛束固定，以免擠倒麻苗。麻苗拔取後一時無法移栽，要把麻苗根部浸在水溝一至二天，使根部萌發不定根芽後移栽，蘇活較易；但浸水不可太久。為便利第一期水稻收穫，應預留空道，空道內不移栽麻苗。

內必須移栽，以免影響成活率。

(3) 行株距：行距四十五公分左右，株距十公分，最好開好移栽溝後，行鼎脚形移栽。

## 陰雨天 適移栽

(4) 移栽：陰天或雨天移栽最好。晴天也可以，但是在下午三時以後。移栽作業和插秧相似，麻苗運到田間後，應將麻苗部向上，放在木盆或竹籠內，使頂芽不沾着污水泥土。普通移栽方法，是以左手握麻苗束，右手取苗後，

## 勤管理·收成好

麻苗移栽後，約經三至四天蘇活，六至七天恢復生長。如果發生缺株，要隨時用比較高大強健的麻苗補植，以使成活後能和旁邊的麻株高度相等。以後的初期管理，應注意下列各點：

(1) 移栽後一天，葉柄常呈萎萎，頂部下垂，三至四天後，原有葉片，大部份脫落，只剩頂芽，這是難免的現象，尤其遇到晴天，更為顯著，請不必擔憂，以後自會慢慢萌發新葉，恢復生長。

(2) 移栽三至四日後，調查麻苗，如頂部伸直，已發新芽，顯已蘇活。蘇活後田間如有積水，要澈底排去，尤以小苗移栽的，更需注意，以免受到浸害，影響生長。移栽後七天，應趕快施肥，每公頃約用尿素六十公斤，過磷酸鈣三十公斤，施肥後須中耕鬆土，以促進生長。

(3) 第二次追肥後管理，和一般麻田相同，並視黃麻生育情形，每公頃酌加硝酸銨鈣一百二十公斤作追肥，以期增產。

(4) 移栽黃麻生長期，多比直播的短，所以肥培管理，務須勤謹，並須及時施用追肥，以促進生長，提高單位面積的產量。(完)

整地移栽

開溝灌水移栽

