



嚴防：

牛瘟 · 牛肺疫
口蹄疫 · 炭疽

侵入本省爲害！

· 紳 守 楊 ·

炭疽

(續上期)

(2) 傳染方法：自然傳染大概都是間接的，不由病畜直接傳於健畜。

(一) 消化器傳染：最普通。牛、馬、羊採食附有芽胞的飼草穀物或飲水而起。猪、犬、鷄、鴿食炭疽病畜的肉血內臟皮革等亦感染。

(二) 皮膚傳染：炭疽菌或芽胞由皮膚小創侵入，或因昆蟲咬傷。人的職業炭疽病(如獸醫屠宰業者、羊毛加工者，都因經常接觸炭疽屍體，或處理皮革毛骨而由皮膚創感染。

(三) 呼吸器傳染：較少，在猪偶而見到。處理羊毛者因吸入芽胞而發肺部炭疽。

(四) 菌苗傳染：使用滅毒的生菌菌苗，在傳染劇烈的地區和抵抗力薄弱的動物，有時發生接種的感染。

最急性數分鐘即死

(3) 潛伏期：自然感染的潛伏期不一定。消化器傳染約一、二星期，皮膚傳染比較短。人工感染的潛伏期一日至十四日，要看如何感染及感染的強度而定。

(4) 症狀：(一)最急性炭疽或卒中性炭疽：自發病至死亡不過數分鐘或二、三小時。在厩舍中，放牧中或使役中突然倒地，全身抽搐，呼吸困難，粘膜青紫，不久即死。此時從口鼻肛門等處漏出少

量血液。本型羊最多，牛馬較少，在流行的初期多見本型。

(二)急性和亞急性炭疽：急性的發病後一至二日死亡。亞急性的，二至五日死亡。普通多取急性型。在流行的末期，或有先天抵抗力的動物，往往取亞急性型。症狀很不一致。

(一)一般症狀：高熱、脈搏增加細弱。呼吸困難。食慾廢絕但也有例外的。泌乳停止。狂狀流涎。精神初興奮後沈鬱。粘膜青紫。眼臉浮腫，生血斑，流血淚。初便秘，後下痢。尿暗黃帶血。皮膚炎性浮腫，有熱痛，如陷於壞疽則發冷無痛，特稱炭疽癰。臨死體溫下降，虛脫而死。

牛羊猪特殊症狀

(2)牛羊猪炭疽的特殊症狀：(1)牛：初期症狀不明顯，食慾、工作和平常一樣，但體溫上昇，可以突死。精神常興奮。皮下浮腫。有時發舌炭疽，咽喉炭疽，咽喉炎，聲門浮腫，直腸癰。(2)綿羊山羊：多發腦卒中，不安震顫。全身抽搐。呼吸困難。速死，所以沒有時間發腸炎和浮腫等。(3)猪多發咽喉炭疽腮腺部浮腫，蔓延於面部及胸部，致咽下呼吸都困難。窒息而死。

(三)慢性炭疽：都是局部性。生前沒有症狀，屠宰時才被發見。病變多限在腸繫膜的孤立淋巴腺，咽部或領下淋巴腺。各腺腫大充血，有灰黃色小壞死灶，或在脾臟見灰色小結節。

(5)經過及療後：數分鐘或一、二小時而死

當您身體不適時需找醫生，

可是當農作物受病蟲害侵襲時，請來找我們……

發財農藥會帶給您豐收發財



請用

萬靈松乳劑

二、三化螟特效藥，低毒速效

美稻松乳劑

水稻害蟲綜合性殺蟲劑

6.5% BHC 水懸粉

飛蟲、浮塵子特效藥

3% BHC 粉劑

飛蟲、浮塵子特效藥

強力加收成水懸粉

紋枯病特效藥

美農乳劑

稻熱病特效藥

西藥生石灰

稻熱病特效藥

鳳梨發乳劑

鳳梨介殼蟲、心腐病特效藥

保滿丹粉劑

甘薯發貯藏用藥

殺鼠靈毒餌餅

安全殺鼠靈藥



(本公司農藥均持有
農林廳登記證)

亞洲化學股份有限公司
總公司：臺北市中正路1140號之四(二樓)
電話：七六八一五
工廠：臺北縣中和鄉四十張 電話：92-2430