

——物植賞觀貴高

茶 花 的 栽 培

楊 紹 博



古最港臺認公生年十九百一蘭宜
「的九」花茶的考

再者，秋季或早冬的茶花，所需陽光要比小茶花樹為強。一般說來，紅色茶花品種所需要的日光，比白色品種為多，因此，種植的位置也應不同。換句話說，紅色茶花品種可以種在向陽的地方，而白色品種則需種植在較陰的地方。

茶花的顏色，和種植的地方，有着密切的關係

性好陰蔽——

較適北部山地生長

茶花是世界的名花，是觀賞植物中最美麗的一種。也正因為它的高貴，茶花比其他木本花卉的種植為難。俗語說「好花不易栽」，就是這個道理。

本人曾於民國五十四年十月，撰寫「茶花栽培前程似錦」一文，刊登於「豐年」花卉特輯，至今二年當中，有不少熱愛茶花的人士，來函詢及有關茶花的栽培問題，為此，今再撰寫此文，說明茶花的栽培要點，以供讀者們的參考。

真正原裝正牌農藥

效果強

(C.P. M. C.)

ブラエス

水稻蓬萊，在萊稻熱病兩用聖藥

農友們!! 請注意，最近有一批不肖份子，假借名義冒牌偽造雜貨假真貨，請各地農友選購時，一定向各地殷實商店購買，才有正牌真貨。

原裝進口商

連勝貿易有限公司

臺北市太原路20號

電話：50669・59679

(本農藥均有登記證)

請用最著名伯力收廠出品農友牌

得滅松

二、三化螟
蟲 大冠星

鋅乃浦・猛乃浦

茶花種植在較陰的地方，生育遠比種植在陽光充足處為好，開花也特別美艷。這個原理，就是因為茶花的原生地，在雨量較多的地區；因為這個緣故，在陽光多而熱的地方，茶花的種植較為困難。

在臺灣來說，山地的茶花生育良好，平地的茶花生育較差；北部的茶花生育良好，南部的茶花生育較差。

種植適期——年底年初都可移栽

氣候溫和的臺灣，茶花的種植，在時間上原無嚴格的限制。通常由十一月開始，到翌年的三月，都是移植的適期。但到新芽一經發出，則需停止移栽。較大茶花樹的種植，需到第二年或第三年時，才會完全復原，所以移植茶花的時期，需要留意。

慎選土地——土質不合切勿種植

栽培茶花失敗，往往是因為土壤酸鹼度不合適而引起的。栽培茶花適當的土壤酸鹼度，是在四·五至六之間。雖然高至六·五時仍能生存，但是生長是不會好的。

又在栽植茶花之前，必需先把土壤的物理性弄好。方法是把泥炭糞土堆肥等，混入於表土之內。通常是在過於黏質的土壤中，加拌適量的沙土。但是過於沙質的土壤，則應混拌適量的黏土。土壤中的生物如蚯蚓等，對土壤物理性的改良是有幫助的，因此，應該加以保護。應用化學的方法來改良土壤，往往需費很大的代價，且效果常不顯著。

茶花的生長和土壤的關係是很密切的。假如土壤不太適合的話，千萬不要栽植茶花。

適度修剪——改進樹姿促進發育

栽培茶花，一般說來很少修剪。但是根據本人的經驗，茶花和其他一些木本花卉一樣，需要加以適度的修剪。茶花修剪的益處如下：

- (1) 可使較小植株保持優良的樹形。
- (2) 可以促成側枝和下部新芽的發生。
- (3) 可以改進樹姿。
- (4) 可以剪去過於高大的枝條。
- (5) 可以剪去受害以及乾枯的枝條。
- (6) 可促使發育健壯。

人工排水——加深植穴補填沙石

茶花的原生地，是雨量較多的山坡地區，按其自然生理習性，栽培茶花不但要注意灌水，同時還需注意排水。

如果土壤黏性或排水不好時，那麼當你種植茶花的時候，必需將穴挖得比

三笠牌農藥

中日合資
保證品質



服務週到
日本技師調配藥劑

得
力
寶
水
和
劑
粉
劑

稻
熱
病
石
灰

B
H
C
粉
劑

美
佳
農
錠
劑

才
才
D
N
乳
劑

其
他
各
種
農
藥

三
笠
F
洗
劑

滲
展
素

台灣三笠化學工業股份有限公司

台灣省彰化市大竹里大竹莊145號

日本三笠化學工業株式會社合資

本公司農藥均有登記證

通常深尺許，下邊填入混合泥土的粗細沙石或煤炭，藉以幫助排水。

陽明山上的茶花生育優異，就是因為土壤是沙質壤土，排水良好海拔四百公尺的山地，由十一月到翌年的四月初。多為陰雨天氣，氣候濕潤，很適合茶花的栽培。民國五十一年時，有一澳籍國際茶花專家來臺。他說他到過很多地方，但是還沒看過比陽明山更適合栽培茶花的地點了。

噴洒灌水——供

應水分並防病蟲

栽培茶花，也是特別重要的一項工作。沙質土壤上的茶花所需要的水分，要比黏質壤土者為多。較陰地方的茶花所需要的水分，則比向陽地方為少。

在天氣乾燥的時候，應每隔十至十五日灌水一次；這樣可以使茶花植株深處的根比近表土的根生長良好。灌水太少會使茶花生長不良；相反的，灌水過多時會減少土壤內的通氣，有害於根部。

噴洒方式的灌水，歐西各國和亞洲的日本，都認為相當需要。因為在天氣炎熱的夏季裏，用噴洒方式灌水，不但可使全樹生育佳良，而且這樣清潔茶花葉面，還可以防止紅蜘蛛的發生。葉面的噴洒時間，應在清早或近傍晚的時候，萬不可在正午時施行，以免干預正常的蒸發，或引起葉子局部的燒灼。此外，當花芽正在萌發的時候，也應避免噴洒灌水。


分期施肥——注意用量避免肥害

對於茶花的施肥，栽培者常持不同的看法。不過茶花是一種喜愛酸性的木本花卉，施用酸性的肥料，當有最好的效果。好的液體肥料和粉狀肥料，也是可以用。

茶花的肥料，需在濕潤的時間內施用，而且不能太靠近樹幹施用。

十二月間施用些肥料，是增加茶花生育的最好辦法，所以比第一次施肥，具有很重要的意義。第二次補充肥料，可在一月間施用；可促進新芽的發生。最後一次施肥，在四月間行之；可促進新芽的生育。

十二月間施肥使用氮素肥料最為理想。腐熟的糞便豆菜、豆稈、和茅草等都很好。尿素、硫酸銨和骨粉等，對茶花生育固然有效，但是用量需要注意。當茶花移植不到六個月的時候，最好不要施用太多的肥料。



「司賓」種品花茶的好最譽臺

新農藥新出品最新特殊性

殺蟲劑兼殺蟎劑

愛殺松乳劑

水稻

蓬萊·在萊種稻熱病特效藥：
粒益穗 液劑 登記證七七一

紋枯病特效藥：
(ブラエス)

新滅菌 液劑 登記證五一



正

農

水稻螟蟲特效藥

寶利多乳劑·特殺松乳劑·能敵師乳劑

登記證310

登記證350

登記證322



豐

藥

介紹果實保護紙袋

黃阿華



形情袋紙護保包套蕉香

據該公司負責人透露，「果實保護紙袋」用紙具有如下的幾項特點：

- ①透氣：袋內與外氣，溫度只差一度，所以果實成熟度又快又平衡，色澤鮮明。
- ②耐水：用水搓洗不破，快乾，在陽光下三分鐘，陰天時十分鐘就乾。
- ③強韌：可耐風速四十公尺颶風而不破。保證可以套袋到採收為止不必更換，甚至可使

用兩次。

④套袋容易，工作效率好。

⑤可染任何色彩，以調節採收日期。

最初的出品，規格定為一二〇×九十公分，每張新幣六角。但可應農友們需要裁製其他尺寸者，價格按大小比率計算。

臺灣合田紙業公司於民國五十四年五月派人赴日考察時，發現日本果園普遍利用特製的果實紙袋來保護生長中的果實，成績甚為佳良。為改進並提高本省各主要青果，如香蕉、荔枝、枇杷、葡萄、水蜜桃、梨、檬果或西瓜苗等的品質和產量起見，該公司曾帶回該項「紙袋」樣品若干，委託臺灣省農會、嘉義農業試驗分所和青果運銷合作社等有關單位代為實地試用，成績十分優異。這一消息傳出，各地果農紛紛要求該公司早日供應該項「紙袋」，以便實施套袋，提高收益。

該公司再經數次赴日與日本合田製紙株式會社磋商，請其提供技術合作，終於決定在臺設立工廠，併由該社派遣高級技術人員數名來臺駐廠抄造，預定近期內開始生產。

本家保險特封照比

(內容：表示家畜保險工作推行或參加保險農友受益情形。

(規格：黑白照，放大為四×五吋，並附寄底片。(審查後可退還)


(截止收件日期：五十六年五月十日。

(獎金：選作該期封面者獎金三百元，未入選佳作在本刊發表者，按一般標準寄贈稿酬。

(收件地址：臺北市伊通街一〇六巷二七號豐年社編輯部。

利大意在司公斯哈門羅國美
品出廠工學化多利飛構機屬附

FILITAL
INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
FRANCE DELLA ROHM AND HAAS COMPANY PHILADELPHIA



可利生

使用濃度：一千倍至兩千倍

農作物瓜類，菸草，葡萄，草莓，柑桔，蘋果，梨，棉花，花卉及各種果樹等極易感染白粉病，同時也容易被紅蜘蛛為害，因而減低收穫量。為防治白粉病兼收殺除紅蜘蛛之效請用

號五七一第證記登藥農

裝原斤公一生利可

標商記登司公斯哈門羅國美

各零售商請向左列可利生現貨進口經銷商洽購，以免誤購偽品：

福農公司：台北市漢口街一段五七號二樓

惠光貿易有限公司：台南市東門路一四〇號

裕台公司農化廠：彰化市平和里和平莊五十號

英明貿易有限公司：基隆市郵政信箱八六號

台灣總代理：青象貿易有限公司

台北市漢口街壹段壹肆號柒壹壹室

電話：三六六一 一七七一

◎說明書函索即寄