

茶花種植在較陰的地方，生育遠比種植在陽光充足處為好，開花也特別美艷。這個原理，就是因為茶花的原生地，在雨量較多的地區；因為這個緣故，在陽光多而熱的地方，茶花的種植較為困難。

在臺灣來說，山地的茶花生育良好，平地的茶花生育較差；北部的茶花生育良好，南部的茶花生育較差。

種植適期——年底年初都可移栽

氣候溫和的臺灣，茶花的種植，在時間上原無嚴格的限制。通常由十一月開始，到翌年的三月，都是移植的適期。但到新芽一經發出，則需停止移栽。較大茶花樹的種植，需到第二年或第三年時，才會完全復原，所以移植茶花的時期，需要留意。

慎選土地——土質不合切勿種植

栽培茶花失敗，往往是因為土壤酸鹼度不合適而引起的。栽培茶花適當的土壤酸鹼度，是在四·五至六之間。雖然高至六·五時仍能生存，但是生長是不會好的。

又在栽植茶花之前，必需先把土壤的物理性弄好。方法是把泥炭糞土堆肥等，混入於表土之內。通常是在過於黏質的土壤中，加拌適量的沙土。但是過於沙質的土壤，則應混拌適量的黏土。土壤中的生物如蚯蚓等，對土壤物理性的改良是有幫助的，因此，應該加以保護。應用化學的方法來改良土壤，往往需費很大的代價，且效果常不顯著。

茶花的生長和土壤的關係是很密切的。假如土壤不太適合的話，千萬不要栽植茶花。

適度修剪——改進樹姿促進發育

栽培茶花，一般說來很少修剪。但是根據本人的經驗，茶花和其他一些木本花卉一樣，需要加以適度的修剪。茶花修剪的益處如下：

- (1) 可使較小植株保持優良的樹形。
- (2) 可以促成側枝和下部新芽的發生。
- (3) 可以改進樹姿。
- (4) 可以剪去過於高大的枝條。
- (5) 可以剪去受害以及乾枯的枝條。
- (6) 可促使發育健壯。

人工排水——加深植穴補填沙石

茶花的原生地，是雨量較多的山坡地區，按其自然生理習性，栽培茶花不但要注意灌水，同時還需注意排水。

如果土壤黏性或排水不好時，那麼當你種植茶花的時候，必需將穴挖得比

三笠牌農藥

中日合資
保證品質



服務週到
日本技師調配藥劑

得
力
寶
水
和
劑
粉
劑

稻
熱
病
石
灰

B
H
C
粉
劑

美
佳
農
錠
劑

才
才
D
N
乳
劑

其
他
各
種
農
藥

三
笠
F
洗
劑

滲
展
素

台灣三笠化學工業股份有限公司

台灣省彰化市大竹里大竹莊145號

日本三笠化學工業株式會社合資

本公司農藥均有登記證