

通常深尺許，下邊填入混合泥土的粗細沙石或煤炭，藉以幫助排水。

陽明山上的茶花生育優異，就是因為土壤是沙質壤土，排水良好海拔四百公尺的山地，由十一月到翌年的四月初。多為陰雨天氣，氣候濕潤，很適合茶花的栽培。民國五十一年時，有一澳籍國際茶花專家來臺。他說他到過很多地方，但是還沒看過比陽明山更適合栽培茶花的地點了。

噴洒灌水——供

應水分並防病蟲

栽培茶花，也是特別重要的一項工作。沙質土壤上的茶花所需要的水分，要比黏質壤土者為多。較陰地方的茶花所需要的水分，則比向陽地方為少。

在天氣乾燥的時候，應每隔十至十五日灌水一次；這樣可以使茶花植株深處的根比近表土的根生長良好。灌水太少會使茶花生長不良；相反的，灌水過多時會減少土壤內的通氣，有害於根部。

噴洒方式的灌水，歐西各國和亞洲的日本，都認為相當需要。因為在天氣炎熱的夏季裏，用噴洒方式灌水，不但可使全樹生育佳良，而且這樣清潔茶花葉面，還可以防止紅蜘蛛的發生。葉面的噴洒時間，應在清早或近傍晚的時候，萬不可在正午時施行，以免干預正常的蒸發，或引起葉子局部的燒灼。此外，當花芽正在萌發的時候，也應避免噴洒灌水。


分期施肥——注意用量避免肥害

對於茶花的施肥，栽培者常持不同的看法。不過茶花是一種喜愛酸性的木本花卉，施用酸性的肥料，當有最好的效果。好的液體肥料和粉狀肥料，也是可以用的。

茶花的肥料，需在濕潤的時間內施用，而且不能太靠近樹幹施用。

十二月間施用些肥料，是增加茶花生育的最好辦法，所以比第一次施肥，具有很重要的意義。第二次補充肥料，可在一月間施用；可促進新芽的發生。最後一次施肥，在四月間行之；可促進新芽的生育。

十二月間施肥使用氮素肥料最為理想。腐熟的糞便豆菜、豆稈、和茅草等都很好。尿素、硫酸銨和骨粉等，對茶花生育固然有效，但是用量需要注意。當茶花移植不到六個月的時候，最好不要施用太多的肥料。



「司賓」種品花茶的好最譽臺

新農藥新出品最新特殊性

殺蟲劑兼殺蟎劑

愛殺松乳劑

水稻

蓬萊·在萊種稻熱病特效藥：
粒益穗 液劑 登記證七七一

紋枯病特效藥：
(ブラエス)

新滅菌 液劑 登記證五一



正

農

水稻螟蟲特效藥

寶利多乳劑·特殺松乳劑·能敵師乳劑

登記證310

登記證350

登記證322



豐

藥