

農友經驗



鳳梨種植前處理

(一)分類——將種苗分成冠芽(着生於果實頂部)、裔芽(着生於果柄上，為最好之種苗)兩種。

(二)剝葉——如逢天旱或山坡地則種苗須剝葉及切瘤，以促早發根生長。如地潮溼則不宜行剝葉切瘤，以免腐爛。

(三)除蟲——種苗上如發現粉介殼蟲，應行撲滅，以防發生萎凋病。

(四)浸藥——種苗須浸在二千倍的富粒多水溶液或五百倍的馬拉松數分鐘，以防水分滋潤。如果是冠芽，則用快速殺菌時加入富粒多或馬拉松水溶液，防變態又防腐。

(五)栽種——浸在藥水溶液數分鐘後，即用鐵鏟撈起放在通風處，隔一週後才可栽種。栽種時面帶口罩，手掛手套，以免中毒。(嘉義縣大林鎮中坑里香山路十七號黃錫壽)

空地種小園葡萄

我種一棵品種優良的葡萄，為了繁殖我曾採用下列方法，所得成果極佳，成活幼苗足夠擴植。方法如下：

(一)從剪定下來的殘枝中挑選一年生枝、粗者、二年生枝亦可，別太老的。然後以切甘蔗苗方法切成多段，所切成的段，有兩個節，節間短者可有三個節，長約為六寸或七寸，注意枝條細者勿用，否則儲藏養份不足供發芽，切好後置於陰處準備插植。

(二)用半量細砂半量堆肥均勻混合，然後覆於砂質壤土上，砂質壤土必須攪鬆並和混好的砂及堆肥(腐熟)又予混合，混合後，將苗四十五度斜插於圃土，其距離為十五公分×十五公分，一個節入土，一節在土面，插完後輕撒砂一層並以樹葉或雜草蓋着以防日曬，但需使苗端露出。下一步為將圃四周圍好，靠北之面以蔗葉或稻草紮成扁層以防北風。

(三)插後晨晚各澆水一次，水不要澆得太濕，最好用撒水壺撒至土面快溢水即停止，插後氣溫高的話三十天可長出芽，等到葉長到五到六片時即可移植，移植時儘量使根部多帶土而植穴用足量腐熟堆攪混，種下後才有足夠基肥，以後即依一般成長枝管理。未移植前若有夜蛾即用馬拉松乳劑五百倍予以驅殺。

(四)苗圃可擇用空地，若以十五×十五公分距離來講，每平方公尺可插三十六條。用砂目的是使易滲水而不積水，同時空氣較充足，使根的生長迅速。在未移植前晨晚澆水不可停止，否則砂土乾會影響的苗生長。

若繁殖量少則可擇陽光充足的庭院邊緣的空地，管理方便，同時加圍護，可防家禽畜的食害。(雲林縣大埤鄉泊雁岸十八號徐江河)

理想的趕牛器

本省大部份的農家都有養牛，有些懶牛須抽打才會認真工作，因此不得不抽打牛之下實也有損人的仁性，為愛護我們勞苦的動物，以發揚人的仁性，特把我製趕牛器的簡易方

法提供給諸位農友參考：

我是把小型罐頭的罐子，拿來以鉛線束緊於趕牛棍上末尾的一端，此罐子須一邊不開，一邊完全開，完全開的那一面朝上)如此就成了實用的趕牛器，只要輕輕一揮就可嚇得牛加緊工作。輕輕拍打，牛聽罐子響聲以為主人要抽打了，就會認真工作。牛耕作久了，就感炎熱直喘着氣，尤其在夏天牛更易喘氣，故可以邊耕田邊淋水甚實用。(嘉義縣大林鎮溝背里九十三號江好楮)


捕捉老鼠的經驗

為撲滅老鼠的作亂，人們不知用了多少方法，但大都是沒有什麼效果，這裏我願介紹幾種我家所經驗不用花錢且很有效的方法：

(一)在老鼠的通路塞上一捲頭髮，頭髮是老鼠最討厭的東西，又不含腐爛，且無須花錢，而極有效。

(二)拿和捕鼠機的開口同樣大小的小鏡子掛在牆上或在木柱上，但小鏡子必須緊貼在捕鼠機後面，捕鼠機裏面吊著老鼠最愛吃的東西，這樣比單放捕鼠機更有效，因為老鼠跑到入口，不知自己影在鏡子裏，以為裏面有朋友，就安心進入吃東西，這樣更容易捕捉了。

(三)直徑約一尺，深度一尺二寸左右的缸子裏，灌進自來水至八分滿，



李永彬 友農

水上撒土少許(約二分厚)的粗糠，使水看不見，在粗糠上面放著豬肉(或老鼠最愛吃的東西)一片，缸子口上放一塊薄板，然後把這缸放在廚房暗處(老鼠經常出沒的地方)，那麼，老鼠因不知道缸裏有水於是跳下缸裏吃東西就會被溺死。(彰化埔鹽鄉永平村員鹿路二三三號李永彬)

木瓜園宜留雄株

對木瓜的栽培，我曾下了很大的工夫去試驗，結果獲得一個寶貴的經驗：即整個木瓜園在開花結實時，發現有一棵或兩棵只開花不結果實，農友們一看說這是雄株不會結果的，於是順手就把它切斷，結果整個木瓜園生產量低所結的果實又小，我以為這是沒有雄花配合的緣故，因此木瓜園中應該要留一或二棵雄株，木瓜的產量才會高，品質才會好。這是我的經驗，有意種木瓜的農友不妨試試看。(高雄內門鄉東埔村二四號張仙德)

絲瓜開花防腐爛

絲瓜雖然栽培容易，但要使它早產甚為困難，因為絲瓜開花往往都會爛掉，不能結瓜甚為可惜。有人說：用竹籤在頭土面約十公分處鑽十字連竹籤不拔起叫做「刺」，這種方法我會試驗過多次效果不十分確實(南瓜這樣確實有效)。

於是我下功夫試驗，結果發現下面這種方法很簡單而且有效，即在初期開花時，在瓜的位置輕輕折彎就可以，這方法簡單而有效，栽培者不妨一試。(基隆市中正區砂子里嶺後巷三號賴松如)