


農葉信箱



稻作

稻田除草劑不能作基肥

嘉義適種臺南五號稻種

【問】：(一)多谷粒劑除草劑是否可以同基肥在整地時施下？如可以的話會不會影響根部發育？

【答】：(一)水稻應肥，最好在水稻生長過程中的什麼時候施用，在正常發育下每甲地可施多少？以那種肥料最好？

【問】：(二)水田粒肥(在出穗後)每甲地至多可施多少？不超過十公斤以那種肥料最適宜？

【答】：(二)嘉義地區一期作及二期作目前以什麼品種最為理想？
 (三)現在嘉義地區發現一種在來種，名為蓬萊接仔，形狀和臺中一號無異，未知其生產量可與嗎？(嘉義縣民雄鄉新山村二一號賴勝男)

【問】：(一)多谷粒劑在整地時與基肥同時施用對根部的發育沒有太大關係，但多谷粒劑除草劑不必在整地時施用，這樣會減低其效果。

【答】：(一)穗肥之施用期約在水稻抽穗二〇一二五天左右，其施用量在水稻正常發育下每甲地不要超過二十公斤之氮素量。

【問】：(二)粒肥以氮肥為主(當氮化鈣即鳥肥不能施用)，每公頃之氮素量以不超過十公斤為原則。

【答】：(二)嘉義地區以臺南五號品種為宜。
 (三)沒有看到標本很難決定是那一種，可能是臺中在來二號，這一品種外形很像臺中

在來一號，但粒形較臺中在來一號為圓，如果是這一品種其產量與一號相同，有時且會超過，但臺中在來二號對稻熱病的抵抗性較一號為差，要注意。(黃正華)

秧田疏播每坪四合

【問】：在豐年雜誌上報導稻種播種時應行疏播，即每坪四合。請問(一)一合有多重？(二)四十臺斤稻種須多少坪秧田？(三)五分地水田四十臺斤稻種夠嗎？(南投縣仁愛鄉萬大發電廠陳炎成)

【答】：(一)豐年雜誌報導，稻種應行疏播，每坪四合，所問三題答覆如下：
 (一)一合約一百克左右(每臺兩為三七·五克)

(二)四十臺斤稻種，如每坪播四合，則需要秧田面積六十坪。

(三)五分地水田播四十臺斤稻種，如發芽率良好可够用。(楊方平)

害蟲病

大蒜基腐病防治

改良排水行輪作

【問】：(一)大蒜枯黃，而根部全腐掉，有何藥劑可治療？

【答】：(一)「大生粉二二」是否可治療南風來襲之損失？或有何防備？(雲林縣南港鄉豐榮村後社路一二四號顏健松)

【答】：(一)根據機本鑑定為基腐病；(Fusarium basillae)其防治法有下列幾點：
 (1)由無地病採種。(2)選擇排水良好之地栽培或使圃場排水良好，並防治土壤線蟲。(3)發病田之殘株應妥為清除燒燬。(4)發病田改種其他作物數年內不可種蒜。

【問】：(二)大生二二為殺菌劑，不能用來防風，南風來襲，可在圃場南邊設置防風籬。(曾慶德)

葡萄流膠原因多

白粉病撒波爾多

【問】：(一)葡萄葉滲出膠質是病害？或蟲害？應如何防止及治療？

【答】：(一)新葉「標本」是什麼病？應如何防止

水稻各種病蟲害特效藥：

螟蟲：特殺松乳劑 · 寶利多乳劑 · 能敵師乳劑

稻熱病(蓬萊·在萊兩用)：粒益穗液劑 プラエス

紋枯病：新滅菌液劑

回本公司農藥均有登記證

豐



藥

最新殺蟲劑兼殺蟎劑：

愛殺松

乳劑

蔬菜

正

全滅靈

乳劑

富特靈

乳劑

吊絲蟲

農