

按成活容易，不過要是大量繁殖的時候則是以扦插法為好。

【含笑、玉蘭以壓條方法繁殖是可以的，其生育不見得緩慢，同時二者均可以嫁接的方法繁殖，含笑還可用扦插法培育。

【含笑、玉蘭以壓條方法繁殖是可以的，其生育不見得緩慢，同時二者均可以嫁接的方法繁殖，含笑還可用扦插法培育。

【含笑、玉蘭以壓條方法繁殖是可以的，其生育不見得緩慢，同時二者均可以嫁接的方法繁殖，含笑還可用扦插法培育。

薯 樹

樹薯製青貯
需經三月啓用

【問】：請指教樹薯的貯製法？（南投縣中寮鄉永福村永平路四四三號吳坤海）

【答】：生樹薯貯製方法如下：

（一）生樹薯製法，拌和二十份的脫脂米糠，裝填入青貯窖，要經過三個月才好啓用，因為生樹薯中的氧氣毒素要長時間才能化解。

（二）樹薯渣不須曬乾即可拌合二十份脫脂米糠做青貯，如曬乾的要浸水六小時後加二十份脫脂米糠。

（三）曬乾的樹薯渣，不要浸水，可拌合四倍的新鮮甘藷或紫雲英青貯。以上的青貯料可養豬或養牛。（黃嘉）

木薯分爲紅白色苦甜種

大量栽培淘汰不良品種

【問】：請詳述木薯的特性與分類。

【答】：木薯的品種，可依其塊根肉皮的色澤或塊根內含氧酸的分佈不同而分類。塊根的肉皮有白色和紅色二類。

臺灣從南洋各地輸入的品種，多爲塊根肉皮白色的品種，肉皮紅色的較少。據農業試驗所的試驗結果，本省優良的木薯品種爲「爪哇四號」、「SRP-3635」、「SRP-3639」、「SRP-3631」、「SRP-3606」等五品種。此等品種塊根肉皮都屬白色，不過目前各農業機關都沒有着重這方面研究。

又木薯就其塊根所含氧酸的分佈情形分類，則分爲苦種和甜種二類，前者塊根的肉皮和肉質部都含氧酸，分量相等，適于製粉用；後者塊根的肉皮部含氧酸肉質部爲多，宜供食用。凡新鮮木薯必須浸水二十四小時，始可煮食，否則有毒。又乾藷煮熟後就無毒。

實地有所謂「黃期種」、「白骨仔」、「黑骨仔」等，可選擇收量高製粉率高者，大量栽培，其餘不良種淘汰之，不必混種在一起。

選擇良種的方法，可將收量較高的單株，塊根收穫時將薯莖砍下保留，妥置陰涼乾燥處所，以供第二年種苗之用。逐漸繁殖起來，不要與其他來源的薯莖種在一起（省農試所何進三）

樹 果

雪柑可以高接

晚崙西亞品種

【問】：（我種有晚崙西亞千株，均六、七年生不等，因配苗不慎，其中有雪柑二百株以上（均七年生），雜植其間，甚不整齊，可否將其高接晚崙西亞？如可高接是一次接好？還是分年（一年接一枝）接好？又高接檸檬如何？）

【晚崙西亞和雪柑均落果甚多，以株計由百分之四十到百分之七十。（指後期落果）我是即地平台階段，有供水設備，肥料農藥均按照有關資料，施用施行，在品質上說：甘酸度、水皮、皮色均可，且今年一級品（果大七、五公分以上無病蟲害）達百分之九十，並常年以葉面噴肥（「培元」）「尿素」增加樹勢，但仍然會落果，原因何在？有無防止辦法？

【「與農」出品的「塞文」，本體是什麼？毒性如何？除金龜子椿象外，可用以防治其他害蟲嗎？又可否與水銀銅劑混合使用？

【四日製銅水銀粉劑，農藥商說：因精製已變爲「中性」，可與馬拉松、米賜多愛等有機磷劑混合使用，確否？如混合使用會發生怎樣的結果？（臺東縣卑南鄉美豐村清萬十一號呂彥武）

品質可靠·藥效良好

乳劑	46.6%	(1070)
乳劑	50%	(1071)
乳劑	50%	(1053)
乳劑	40%	(1052)
乳劑	50%	(1054)
乳劑	6.5%	(1018)

和豐安治蟲滅

松谷樂樂淨速

豐谷必枯

和豐安治蟲滅

松谷樂樂淨速

豐谷必枯

和豐安治蟲滅

松谷樂樂淨速

豐谷必枯

和豐安治蟲滅

松谷樂樂淨速

豐谷必枯

和豐安治蟲滅

松谷樂樂淨速

豐谷必枯

和豐安治蟲滅

松谷樂樂淨速

豐谷必枯

和豐安治蟲滅

松谷樂樂淨速

豐谷必枯

和豐安治蟲滅

松谷樂樂淨速

豐谷必枯

和豐安治蟲滅

本刊廣告價目

封底全頁（二色）	四千九百元
封面全頁	四千四百元
封底全頁	四十元
正文第一頁全頁	三千八百元
正文內頁全頁	三千五百元
正文內頁半頁	一千九百元
正文內頁四分之一頁	一千四百元
正文內頁六分之一頁	一千零五十元
正文內頁八分之一頁	七百五十元
小廣告 每行十元，超過二十行部份	六百元
每行二十元。	

天理 大和農園種子

天理 金力甘藍

天理 早生富研西瓜

天理 綺王西瓜

天理 小玉西瓜

天理 ニューメロン

天理 金城香瓜

天理 草花種子

天理 草花種子

天理 草花種子

天理 草花種子

天理 草花種子

天理 草花種子

天理 草花種子

天理 草花種子

天理 草花種子

天理 草花種子