

【答】：(一)水田種稻最重要的是要注意排水，以免發生腐敗病。

(二)多施堆肥對生薑的發育最有效。
①是土地過於肥沃，水稻生長過旺所致。
②少施氮肥，多施鉀肥對結實有利。
③可用普通建築用的石灰。

因石灰最好單獨在整地前作田間全面撒施，然後耕入土中。旱田石灰分之流失較慢，可數年施用一次，水田流失較快，應隔年

施用一次。施用石灰之土地應多施堆肥，才

能補充地力。

(四)可用客土(混入砂土)方法改良土質，或多施綠肥與堆肥等有機質肥料，可慢慢變化改良土壤。

(五)因生薑連作時易患腐敗病(蟲株在生育期間枯死，且傳染很快)，為預防此病，最好不要連作。(陳文郁)

栽培晚種牛皮菜

可免高溫期抽苔

早抽苔者，但近幾年來，不論秋前或秋後播種，均早期抽苔何故？

(二)養雞用劍葉亦有同樣現象發生何故？

(三)何處有售抽苔的優良品種？(員林

縣員林南陽村二〇一號李獅)

【答】：牛皮菜(芥菜)和萬青的抽苔與溫度有關，高溫容易抽苔。本省中南部前年(五四)與去年(五五)秋季氣溫較高，致使此等菜類容易提早抽苔，故如選用晚生品種，延遲播種並多施氮肥，則可避免提早抽苔現象。(邱鴻昌)

無其他用途。

(二)近年來由於擬避黃龍病之禍害，致不少柑農或苗木商亂用野生柑桔作為砧木而行嫁接，香圓亦為他們所採用砧木種類中之一種。但香圓樹勢雖強，惟耐寒力頗弱，不適作為桃樹、甜橙或其他柑桔類的砧木或根接用砧。(翁仁祿)

中部冬薑花龍蕉

留三、四月萌芽

【問】：冬薑與花龍蕉應留何時萌發的芽？山地與平地是否相同？(黃瑞益)

【答】：(一)南部有灌溉的地區，每年留芽，即三、四月之萌芽。

(二)嘉義農業試驗分所試驗結果，三、四月留芽者，如無灌溉時，留芽至果實採收約為五百五十一至五百六十天，若行灌溉則可提早一、二個月收穫。(蔡勝)

木瓜乳採自未熟果實

成品須磨碎密封抽氣

【問】：貴刊第十七卷第五期信箱欄所刊，木瓜乳是否從木瓜樹所採？採法怎樣？

採後怎樣保存？怎樣製成酵素？其價值如何？(朴子鎮山通路一六〇號陳榮輝)

【答】：木瓜乳是採自未成熟的木瓜果。


採收方法與次數則由於品種、季節、株齡、勞力等而異。一般說來刺割深度約在〇·一至〇·二公分之間，刺割數間相隔距離可採一公分，每隔四十八日割四十道，由

於開始採收時果實成長大小而異，刺割到第十次時產量約為第一次的十分之一。採收後利用攝氏五十度乾燥，一般以真空乾燥較熱風為佳。啤酒工業、醫藥及肉類軟化等方其磨碎密封抽氣即為成品，此種成品由於酵素活力售價有所不同，每公斤價約為新臺幣二百四十二百八十元之譜。(戴邦本)

原裝進口

賜滅多乳劑

スマイト




徵求各地零售商店
希望者請即報名

亞久力

一倍
展着劑

紅蜘蛛
最新特效藥

スマイト乳劑本年度新增加推廣之紅蜘蛛藥劑。
中名為「賜滅多」具有下列五大優點：①スマイト乳劑2000倍對各種紅蜘蛛具有速效性，尚且有一個月以上長久持效性。②對別種藥劑已具有抵抗性之紅蜘蛛亦能殺功效。③與波爾多液及其他一般農藥均可混用。④對人畜無害。⑤物價廉，使用安全。



製造廠：兼商化學工業株式會社

發賣元：兼商株式會社

總代理：文山企業行

臺北市南京西路416號 電話：42203