

畜家

飼養肉牛可粗放經營

何建築？
 (一)肉牛除以青草製成青貯飼料外，應如何配合其他飼料？(花蓮新城鄉博愛路安東農場蔡龍成)
【答】：(一)飼養肉牛應當儘量採取粗放方式經營，因此以不修建牛舍為原則。假如必需要有牛舍時，搭一草棚，以供一年中最惡劣氣候逃避連續大雨之用。
 (二)上面說通飼養肉牛以最經濟方式經營，所以以青草製成青飼料亦以單獨青草為原料，不必配合其他飼料。(林誠華)

羊糞沼氣不如豬糞

沼氣池寬比深重要

【問】：(一)乳羊的糞尿是否能做沼氣？其效果比豬糞如何？
 (二)豬糞沼氣池能不能適用於羊糞？
 (三)沼氣池之構造如何？
 (四)沼氣池的寬與深那方重要？
 (五)如何防止浮上物及處理方法？(臺南市成功路八巷五號王豐文)

【答】：(一)乳羊糞尿是否可做沼氣，尚無人做過，故不詳。惟羊糞與牛糞較為類似，牛糞可利用為醱酵沼氣，羊糞原理也能利用，但其效果可能比豬糞差。
 (二)沼氣池建築可與豬糞沼氣池同。
 (三)構造請參考「養豬致富記」一書內的建造圖。
 (四)沼氣池寬比深重要，因為可增加醱酵面與貯氣量。
 (五)可以在醱酵池上置一浮木，用塑膠繩縛住繩子末端，從通廢液池之通管穿入，這樣可上下拉繩以打破浮上物。(余如桐)

木林

苦荬樹應育苗造林

春季未發芽前移植

【問】：(一)擬大規模營造苦荬樹林，其栽培方法與要點如何？

(二)若苦樹適應何種土壤與氣候？
 (三)種子如何採集與處理？
 (四)播種之準備管理事項及移植之方法如何？(南投縣水里鄉車埕村二號張錦昌)

【答】：(一)苦荬樹對於氣候與土壤之適應力均強，生長迅速，為傢俱良材。若大規模造林，則須選擇苗圃，培育苗木行植樹造林，但亦可行播種造林。
 (二)苦荬樹適於暖熱氣候，及比較肥潤之砂質壤土，但也能耐潮濕鹼土及耐酸性土壤。在臺灣海拔八、九百公尺以下地區均可生長。
 (三)十月左右核果呈黃色時，即可採取，亦可於十二月間檢拾落地者。浸水三、四日，混草木灰洗去果皮，晒乾貯藏之。
 (四)二、三月間可先掘起種實浸水三、四日，用點播法播下，(亦有行條播法者)。株行距約十二公分。覆土約二公分，並應覆草。天旱則須常澆水。約五、十天左右即可發芽，此時須除去覆草。再過三、四十天須除草，同時並間拔去一部份柔弱之小苗。肥沃苗圃，滿一年生之苗木高達七、八十公分者即可出山。若床土薄薄苗高祇二、三十公分者，則須剪去一部份直根及葉，移植一次後再行出山。移植之株行距各約十四—二十公分。

卉花

水仙花用鱗莖繁殖

適合較高山地栽培

【問】：(一)水仙花有幾種？
 (二)其習性如何？
 (三)繁殖及管理法如何？
 (四)離切法怎樣？(陽明山山仔后陽明里五十一—一二號張偉中)

【答】：(一)水仙花(中國水仙)通常有兩種：一種是「金盞銀(玉)合」，是單瓣。另一種為「玉玲瓏」，是重瓣。
 (二)水仙花是球根花卉，地下部分為鱗莖，水仙花在秋後開始生長，夏季休眠。
 (三)以小鱗莖繁殖，須培養三年始可達到

農林廳農肥字第0040號



台農牌 複合肥料

粉狀 四種類 粒狀

適合各種農作物生長 結實期使用


經台中青果合作社審查合格 並承蒙推薦各果農使用

台農盛化學工業股份有限公司

台北市民權西路62號 電話：45249

成份確實 肥勁持久

提高產品 改良土質



寶島牌

性能最強

型式最新

機機 耕發

1. 國家標準試驗合格，精良產品。
2. 選購寶島牌耕機，均可享受長期低利資金貸放。

本公司為擴展業務，誠徵各地經銷服務中心或兼業推銷員，待遇特優，簡章備索。

洽義發精機公司

彰化縣埤頭鄉合興村斗苑路17號
 信箱：埤頭1號 電話：埤頭12·14號