

畜家

飼養肉牛可粗放經營

何建築？
【問】：(一)最合實際肉牛舍，應如何建築？

(二)肉牛除以青草製成青貯飼料外，應如何配合其他飼料？(花蓮新城鄉博愛路安東農場蔡龍成)

【答】：(一)飼養肉牛應當儘量採取粗放方式經營，因此以不修建牛舍為原則。假如必需要有牛舍時，搭一草棚，以供一年中最惡劣氣候逃避連綿大雨之用。

(二)上面說通飼養肉牛以最經濟方式經營，所以以青草製成青飼料亦以單獨青草為原料，不必配合其他飼料。(林誠華)

羊糞沼氣不如豬糞

沼氣池寬比深重要

【問】：(一)乳羊的糞尿是否能做沼氣？其效果比豬糞如何？

(二)豬糞沼氣池不能適用於羊糞？

(三)沼氣池之構造如何？

(四)沼氣池的寬與深那方重要？

(五)如何防止浮上物及處理方法？(臺南市成功路八巷五號王豐文)

【答】：(一)乳羊糞尿是否可做沼氣，尚無人做過，故不詳。惟羊糞與牛糞較為類似，牛糞可利用為醱酵沼氣，羊糞原理也可利用，但其效果可能比豬糞差。

(二)沼氣池建築可與豬糞沼氣池同。

(三)構造請參考「養豬致富記」一書內的建造圖。

(四)沼氣池寬比深重要，因為可增加醱酵面與貯氣量。

(五)可以在醱酵池上置一浮木，用塑膠繩縛住繩子末端，從通廢液池之通管穿入，這樣可上下拉繩以打破浮上物。(余如桐)

木林

苦荬樹應育苗造林

春季未發芽前移植

【問】：(一)擬大規模營造苦荬樹林，其栽培方法與要點如何？

(二)苦荬樹適應何種土壤與氣候？

(三)種子如何採集與處理？

(四)播種之準備管理事項及移植之方法如何？(南投縣水里鄉車埕村二號張錦昌)

【答】：(一)苦荬樹對於氣候與土壤之適應力均強，生長迅速，為傢俱良材。若大規模造林，則須選擇苗圃，培育苗木行植樹造林，但亦可行播種造林。

(二)苦荬樹適於暖熱氣候，及比較肥潤之砂質壤土，但也能耐潮濕鹼土及耐酸性土壤。在臺灣海拔八、九百公尺以下地區均可生長。

(三)十月左右核果呈黃色時，即可採取，亦可於十二月間檢拾落地者。浸水三、四日，混草木灰洗去果皮，晒乾貯藏之。

(四)二、三月間可先掘起種實浸水三、四日，用點播法播下，(亦有行條播法者)。

株行距約十二公分。覆土約二公分，並應覆草。天旱則須常澆水。約五、六十天即可發芽，此時須除去雜草。再過三、四十天須除草，同時並間拔去一部份柔弱之小苗。肥沃苗圃，滿一年生之苗木高達七、八十公分者即可出山。若床土薄薄苗高祇二、三十公分者，則須剪去一部份直根及葉，移植一次後再行出山。移植之株行距各約十四—二十公分。

(五)栽植可於春季未發芽前行之。苗木可選用滿一年生高達五、六十公分以上者，株行距約為二公尺。(黃希周)

卉花

水仙花用鱗莖繁殖

適合較高山地栽培

【問】：(一)水仙花有幾種？

(二)其習性如何？

(三)繁殖及管理法如何？

(四)離切法怎樣？(陽明山山仔后陽明里五十一—一二號張偉中)

【答】：(一)水仙花(中國水仙)通常有兩種：一種是「金盞銀(玉)合」，是單瓣。另一種為「玉玲瓏」，是重瓣。

(二)水仙花是球根花卉，地下部分為鱗莖。水仙花在秋後開始生長，夏季休眠。

(三)以小鱗莖繁殖，須培養三年始可達到

農林廳農肥字第0040號



提高產品 改良土質

成份確實 肥勁持久

台農牌 複合肥料

粉狀 四種類


適合各種農作物生長 結實期使用

經台中青果合作社審查合格 並承蒙推薦各果農使用

台農盛化學工業股份有限公司

台北市民權西路62號 電話：45249

寶島牌



性能最強

型式最新

機機 耕動 發

1. 國家標準試驗合格，精良產品。
2. 選購寶島牌耕機，均可享受長期低利資金貸放。

本公司為擴展業務，誠徵各地經銷服務中心或兼業推銷員，待遇特優，簡章備索。

洽義發精機公司

彰化縣埤頭鄉合興村斗苑路17號
信箱：埤頭1號 電話：埤頭12·14號