


美國最新

# 防治紅蜘蛛劑



## 愛殺松

### ETHION 4 EC

註冊商標 1008 號

本劑能迅速防治紅蜘蛛！

并同时防治介壳蟲、毛蟲、蚜蟲、

捲葉蟲等。

各種蟲害一經接觸，即趨死亡!!!

稀釋一〇〇〇倍

總經理：正豐化學股份有限公司

霧峰草湖路二號  
電話：六三三

並倒蔓地上，此時即應將蔓牽引架上，方法是用細桂竹插在株際，並引蔓於竹上，用草綁住。不久蔓上本身的捲鬚即可自行纏住往上爬，若干月後即應將架下主蔓修剪到各剩二、三條為止。

## 施肥

第一年只有儘量使它生長，所以以氮肥為主。翌年春天已屆開花期，其間應兼施磷鉀肥。本作物一面開花一面結果，花期八個月，結果期也是八個月，所以由二至十月間應不斷施肥。肥料的比例為過磷酸鈣八包，氯化鉀七包，尿素二包，混合拌勻後，每株每兩個月各施一公斤，全面撒施。所以每甲地每次施肥須用上述混合肥料一千公斤之多。施肥前應將土面略為動鬆。

## 人工授粉

百香果須行人工授粉才能結果，但本省野生種則為例外。花粉要由別株或較多株取得，每天開花時間為中午到黃昏，所以授粉時間在下午。先用手摘取花上的雄蕊，由許多株上收集置杯內，以水彩筆稍拌動，筆毛上即附着很多花粉，以此筆邊走邊授粉，即將筆毛觸到雌蕊株頭部即可。如果授粉完全，次日花即不會謝落，每小時每工約可授粉六百至九百朵。雨天不可行授粉，因授粉後花粉易被雨水沖走，可能無甚效果。

## 採收

授粉後約五十五至七十天即可成熟，自行掉落地面。因為果皮質韌不會跌破。以果皮變黃起皺時為成熟，採收時只須在架下巡拾即可。因到結

果期時枝葉已很茂盛，地面已不再長草，所以很容易採取。每株二年生者可採收四十公斤左右。第三年生者可收七十公斤左右。第五年後產量漸減。

## 冬季剪定

十一月份進入冬季，此時已近採收末期，可用鐮刀將垂到架兩側的藤蔓砍除，只留頂面俟明春再發新蔓，同時將果形不良株和小果株等全株拔除。在第二年採收後並應每隔一株淘汰一株，最後每甲地只留五百株，但絕不致影響產量。

## 病蟲害

本作物少有病蟲害，尤以初植幾年內更不易發生。



圖果果香百的場農山金