

？有關產量如何？

(二)或可採用地土約一·五公尺高的直立三線式葡萄棚架？

(三)砂質土壤種植鮮食用葡萄，應選擇何品種最好？(吳清聲)

【答】：(一)豐年第十七卷第二期所刊載的「直立式葡萄棚架」即「最新果樹園藝學」一書上所稱之垣籬整枝之支架。

垣籬整枝為夏乾地帶所採用之整枝方法，但在臺灣由於溫度高，濕度大，葡萄枝條之伸長太大，故一般不可採用，近年臺灣各地有採用四尺高之垣籬整枝者，其成績並不良好，惟在傾斜、乾燥、少雨少風之地，可試用六尺高之垣籬形整枝，並用「賀衣布冷氏」整枝法，(行距二公尺，株距二·五公尺)。

「賀衣布冷氏」整枝法適于各種品種，可依主枝之彎曲角度及結果枝之數，調節其生產。

(二)一·五公尺太矮，宜採用二公尺高三線式。(請參考最新果樹園藝學)。

(三)現在臺灣鮮食用品種，以巨峯、伯禮諾克終。

### 修整梨樹發育枝

#### 促進形成結果枝

【問】：(一)八年生青東大梨，已有空心

圓頭型整株，目下(三月)正在新生結果枝，是否須要將結果枝條(不論大小枝條)留

四·六節外摘心？或者將粗大結果枝條留一尺許摘心？細小枝條不要摘心？

(二)如有同一節中生出二·三枝的結果枝，是否須要淘汰而留一枝，或者不要淘汰即全部留起來而摘心就可？

(三)今年生枝條如上下面條淘汰，即留存兩側枝條並留四·六節外摘心？或者留尺許外摘心？

(四)花芽都形成在結果枝條末端，目下或夏季將今年生結果枝條摘心，能不能再形成花芽？或者影響明春開花？(彰化縣花壇鄉三村後厝巷四十號顧明哲)

【答】：

(一)

梨以短結果枝結果為主，目前所發生之枝，據園內所稱均係發育枝，並非結果枝，結果係由此枝之腋芽形成，故應

限制其發育枝省分以供結果枝之形成。對

此類發育枝在溫高而濕度大的地區，夏季宜稍或捺梢法以限制其生長。由於長度生長受

限制，其腋芽可發育充實，當年或明年由腋芽形成短果枝結果。留四·五節修剪是指在冬季修剪時所採用，如用於夏季則刺激過甚

，易使枝梢側芽均發生成發育枝。

(二)同一節只留一枝梢，宜早剪除其餘者，所留枝梢超過一尺許亦需摘心。

(三)留尺許摘心。

(四)花芽形成均在七月間，平地早些，但多在短枝之末端，現在無花芽，可能再有一次生長(平地)也會形成花芽，為明年開花者。(朱長志)

## 牧畜

### 肉牛前途好 疾病蟲害少

【問】：(一)飼養肉牛，有無前途？

(二)南投縣內何處可飼養？肉牛適合金飼或放牧？如放牧一分地可放飼幾頭牛？

(三)何處有出售肉牛？有幾種品種？何品種適合本省氣候而且容易飼養？

(四)犧牛出售價格如何？每隻飼養年限多長？每頭可得淨利多少？

(五)飼養上有何困難？如疾病和蟲害等。

(六)飼料何種較好？應如何配合？

(七)牧草何種適合飼養肉牛？栽植容易否？每分地應栽多少？何處可購得幼苗？(南投縣魚池鄉大雅村大雅巷四五號林精忠)

(八)肉牛價格上漲，全省畜牛頭數每年遞減，可以看出肉牛是有前途的。

(九)飼養肉牛必需有充足草料，南投縣凡有草源地區都可用以飼養肉牛，飼養大批牛隻當以放牧為宜，一分地可養幾頭牛，並無一定的規定，最主要是以一分地可以生產多

農友們!! 種植夏時甘藍 請選購

農業改良場夏時甘藍種植品評會獲得最優良成績的

**頂好甘藍** (ベスト甘藍)  
日本農林大臣賞受賞  
**脫普甘藍** (トツブ甘藍)

去年七月初旬新竹區改良場為品評輸入品夏時甘藍之優劣種植，在臺灣十數品種之夏時甘藍，在品種、耐雨、耐熱各項條件比較下，以敵公司總經銷之頂好甘藍為最優佔第一位，脫普甘藍佔第二位，夕葵初秋甘藍佔第三位。現以夏時甘藍種植期又到了，歡迎各農友採購種植來增加收益。

**頂好甘藍** 原封罐裝每瓶60ml(約1.1兩) 100元

**脫普甘藍** 原封罐裝每瓶1.5兩 130元

正紅心、豐滿、鮮麗、整一

品質最好、價格最高

八江農藝榮譽產品

## 新黑田五寸人參

市面類似品甚多請認明 八江“ヤエタメ”商標  
，以免被騙，全省有名種子店均售。

其他美國產、結球萵苣、洋芹菜，外銷用厚肉大甜椒，等各貨全部入貨，價格表函索即寄。

臺灣總代理 **臺灣農產企業公司**


臺北市迪化街一段86號·電話：42365·44253

### 岡恒老牌

天下一品

赤白ビニール卷

現貨供應



總經銷 新高貿易股份有限公司 臺北市峨眉街68號  
電話：34190 號