

農葉信箱



稻作

水稻臺南五號新品種

抗稻熱病小粒菌核病

【問】：(一)水稻臺南五號品種是否適合北部栽培？

【答】：(一)何處可得該品種(黃米秀)？

【問】：(一)水稻臺南五號第一、二期生育日數多少？在中部適合那期作？產量比新竹五六號如何？

【問】：(一)對那種病蟲害抵抗力強？那種弱？(張肇炳)

【答】：(一)水稻臺南五號品種，在北部現尚未試種，故其成績不詳。

【問】：(一)請用費鄉鎮公所或農會公文，向臺南區農業改良場申請發售。

【答】：(一)水稻臺南五號生育日數：一期作於二月中旬插秧者約一百一十九天，二期作於七月中旬插秧者，約九十五天。在中部一、二期作，均適合，但與臺南八號或臺南一號比較，其增產率為中間作及第二期作較高。產量與新竹五六號比較，在臺南區農業改良場嘉義分場試驗結果，則較高，但在新竹區及其他地區尚未有試驗。

【問】：(一)經臺南場抗病性檢定結果，對稻熱病與小粒菌核病的抵抗力強。對紋枯病即屬中等。(傅安石)

防治穗稻熱病

應抽穗前施藥

【問】：在水稻孕穗期來不及施藥防治

穗稻熱病，那麼在抽穗期中噴有機水銀劑，是否有預防穗稻熱病之效果？(桃園縣平鎮鄉東勢村金鷄湖三一號曾盛淦)

【答】：防治穗稻熱病，應該在抽穗前施藥最重要，據所述該時期未噴藥，而預定於抽穗期施用有機水銀劑，並不理想，因一般於抽穗期中施藥最易引起藥害，故應待齊穗期始可施用有機水銀劑，但該劑勿用於在來稻，以免藥害(簡錦忠)

果樹

木瓜接木不實用

蘇魯一號有推廣

【問】：(一)聽說桃園大溪有人栽培矮種木瓜，臺北六張犁有人幾種非律賓種木瓜而獲利。又說木瓜可以接枝正確否？種法是怎樣，那一種品種最好？

【答】：(一)那裏可以獲得木瓜種植法參考書？

【問】：(一)三月十八日徵信新聞農友園地裏刊登適合本省栽培，藥用植物「紅椒」。未知紅椒種子那裏有？是否市面上出售青黃色的果子。大約一寸左右直徑，用硫磺焙煉即成紅椒？怎樣焙煉法？

【答】：(一)用什麼方法加工才能像雜貨店賣的那樣？(沈萬定)

【問】：(一)栽種木瓜普通皆採播種子育苗，因本省木瓜品種混雜，系統不一，故無單一品種推廣，僅鳳山熱帶園藝試驗分所選出蘇魯一號木瓜推廣各地，但目前種子已售完，須待今秋另採供應。雜交一號矮生，果形大，產量高。木瓜可以接木，但不實用，也不普遍。


【問】：(一)請向南投縣中興新村省政府農林廳農業推廣教育室，索取木瓜栽培小冊參考。

【答】：(一)大陸華北盛產紅椒，其與青黃皮印皮椒不同，種子不易得到。惟青黃皮印皮椒用硫磺薰後可以變紅一節，現尚無此項資料，無法知道。

【問】：(一)清晨選擇尚未開放的花蕾採收，普通用稀薄鹽水採洗，後再迅速曬乾即可出售。(王兆全)

正豐農藥

- 水稻紋枯病：新滅菌 液劑
- 葉面青蟲：強力特殺松 乳劑
- 螟蟲：能敵師 乳劑
- 陸稻、水稻除草劑：思登卅四 乳劑
- 強力水稻除草劑：多谷粒劑
- 蔬菜青蟲、吊絲蟲：全滅靈 乳劑
- 富特靈 乳劑
- 柑桔紅蜘蛛：強力開路生 乳劑
- 愛殺松 乳劑



回本公司農藥均有登記證



正豐化學股份有限公司 台中縣霧峰鄉草湖路二號 電話 霧峰 63 號

山地果園種綠肥

按其耕期選品種

【問】：我有山地種梨、荔枝，因路遠又崎嶇不平，堆肥運搬施用困難，要用綠肥代替，不知紫雲英或綠萍可否使用？或有其他更好的種類？每分地要若干種子？怎樣播種？（臺中縣新社鄉新五村車站邊王春雨）

【答】：(一)三、五月間可種植綠球大豆或越南豇豆，均採用疏疏條播，行距約一畝尺半，每公頃播種量為十五公頃。

(二)十月間可種植苕子，採用點播，每穴播種三、四粒，株距一、二畝尺，行距二、三畝尺，每公頃播種量約五公頃。

(三)如果樹基大，果樹間隙地甚少，應在塘段邊沿上種植多年生「山珠豆」。

以上所列綠肥種，請向「新社鄉大南村農林應種苗繁殖場」洽購。（張國勳）

蔬 菜

栽培莖薯宜深耕

【問】：要栽培莖薯（薯仔薯）請問其栽培方法如何？（基隆市義二路一七五號之一富貴市場內李貴）

【答】：莖薯之栽培要點如下：

(一)播種期：南部九至十一月，中北部三月至八月。

(二)土壤：砂質土。

(三)播種：土壤要深耕，畦寬一五〇公分作高畦，每畦四行，行距三〇公分，株距二十五公分。用點播，每穴播二粒種子，十公畝播種量約四公畝。

(四)施肥：基肥每十公畝地施腐熟堆肥二千公畝，過磷酸鈣五十公畝，硫酸鉀二十公畝。撒施後鋤入土中，發芽後二個月內，如生育不良，再用豬糞尿追肥一、二次。

(五)除草及中耕：每半個月行一次，中耕不宜過深，以免傷害根部影響根球之肥大。

(六)其他管理：①發芽後約有真葉三、四葉時，行間拔每株穴留一株。②春播者，畦面敷草，以防雜草之繁茂及防止雨水沖失畦

土。③土壤乾燥時宜行灌水，但生育後期應保持土壤乾燥，以免影響根球之品質。④莖薯過旺時宜行摘心，抽苔開花時亦應摘除花枝，以助根球之肥大。

(四)採收：播種後一五〇、一八〇天可採收，採收時注意不可傷害薯塊，採收宜在土壁乾燥時施行，十公畝地產量約二千、四千公畝。

(五)貯藏：選擇病蟲害及無損傷之薯塊堆放屋內冷涼之處置草或蓋乾土貯藏，貯藏中避免潮濕以免腐爛，又高濕容易引起空心，貯藏良好時可保存六個月左右。

(六)病蟲害防治：蟲害有蚜蟲及紅蜘蛛，可用益加津八百倍液防治。病害有銹病及炭疽病，為害嚴重時會引起葉片全部枯落影響產量及品質，發生初期可用大生七十八加水四百倍液防治。（陳文郁）

木 林

桃花心木葉早整枝

分枝以下應全剪除

【問】：(一)我的桃花心木與印度紫檀已造林五年，樹幹上生出分枝很多，要全數除去麼？或每距離五、六公尺處留二、三枝，作為日後打枝的立足點呢？

(二)目下情形是樹幹高而細，不能負荷一人的重量，打枝要怎樣做？需用何種工具？

(三)國有林班對這項工作，是如何進行的？（屏東春日鄉古華國校劉化之）

【答】：(一)桃花心木與印度紫檀等應及早施行打枝，以養成良好通直的獨幹木材。

(二)實行打枝不可過度，以免影響林木的生長，應適度施行。

(三)分枝以下的枝條要全除，不必留二、三枝作為日後立用。

(四)打枝工具為剪枝刀、小手鋸（套柄長木柄或竹柄）、草鏟等。站立地上或利用輕便小梯實行作業，切口必須平滑。

(五)國有林對是項工作，因經費所限，僅在無育刈草時酌行修枝而已。（林務局）

原裝進口

賜減多

乳劑

スマイト



亞久力

一萬倍展着劑



紅 蛛 最 新 特 效 藥

スマイト乳劑本年度新增加推廣之紅蜘蛛藥劑。中名為「賜減多」具有下列五大優點：①スマイト乳劑2000倍對各種紅蜘蛛具有速效性，尚且有一個月以上長久持效性。②對別種藥劑已具有抵抗性之紅蜘蛛亦能獲功效。③與波爾多液及其他一般農藥均可混用。④對人畜無害。⑤物價廉，使用安全。

製造廠：兼商化學工業株式會社

發賣元：兼商株式會社

總代理：文山企業行

臺北市南京西路416號 電話：42203

寶作連 根素開

最理想的 稻熱病 防治法

各位農友，這二年來的稻熱病與往年不同。

葉面有稻熱病的紅點，稻稈黃黃萎萎，根部變黑，噴灑水銀劑或西樂生石灰也繼續枯萎，甚至致死。這是因為葉面的稻熱病菌雖然殺死，但敗根現象即尚未治癒的關係，無法恢復生長，繼續枯萎。

這樣的情形只有 **連作寶 開根素** 可以治癒

用法如下：

- ①水15公斤……（大桶噴霧器）
 - ②連作寶開根素 8公克（瓦）
 - ③尿素…75公克（瓦）【即二兩】
 - ④非肥皂粉……10公克（瓦）
- 【可使藥水均勻塗布於葉面】
- ⑤水銀劑…照說明規定量之半量
- 三日噴灑一次，三次即可恢復。殊在出穗後之穗稻熱病或毒素病、或乾莖病狀，必須用本配方才治癒，如患紋枯病即不要水銀劑而用紋枯病藥。平常摻各種農藥噴灑對增收，健穰作用甚大。如摻西樂生石灰同時撒粉每分地45公克效果最好。

（45公克裝批價15元）

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉景平路47之2號
電話：923111 郵政劃撥5179號

使用農藥時摻本品可防治各種農藥無法防治之不知名病症，並且可加速恢復病弱現象，平常向葉面或根部噴灑均有強烈之開根作用。

萬病之源在根弱

增收關鍵在開根

（普通乳牛生後十六至十八個月生長發育正當者就可以配種，滿二歲左右就可以生產，因此在此階段之乳牛，應算是成熟乳牛也就是成熟年齡。健康的乳牛（二十四歲）體重平均在三百五十一四百五十公斤（荷蘭乳牛）。

（乳牛經一次交配後如果配種時間與母牛排卵時相配合（巧合），於是精子與卵子結合起來即開始進入妊娠期，經二百八十二百八十五天開始生產。母牛產仔後就開始產乳，產乳期最好是十個月（實際上可以超出十個月），本省荷蘭乳牛平均一產乳量約十二公升。

（四一歲半乳牛，目前每頭價格約在一萬二千五百元。

（每頭成年乳牛一日需草量大約四十五十公斤。一年需草量約一萬五千一二萬公斤。因此一頭乳牛所需草地當視土地性質，如有灌漑農田約需〇·五十分地。而旱田則需三·五分。

（燕麥每公升十五元左右（種子價）。

（乳牛每日每頭所需精料費用多少不能一概而論，應當依類型的乳產量多少而作加給精料標準，如上面說過本省乳牛平均每頭每日產乳十二公升計算，補給精料約為四公斤，每公升精料以三·五元計共需十四元。

（牧草地普通以砂質壤土為優。

（家畜保險業務皆由縣農會辦理，高雄、市縣農會是否辦理請直接函詢。

（呼吸次數普通是指一分鐘多少次數。來函所問一百一一百三十次應該是時一分鐘時間，其表示牛隻中毒後呼吸加速現象。（林誠華）

其他

凡繳清農電工程費 施工時不另收費

【問】：（農村電化工程費，除電力公司及省政府補助外，以多少長度以上才由農戶負擔？）

（因電力不足，須再加線一條，其線錢是否電力公司負擔？或由農戶負擔？）

（電力公司來農戶接電，其數運電桿及其他器具，是由農戶出錢？或由電力公司負擔？）

（宜蘭冬山鄉九山村九山路三三號莊石金）

【答】：（農村電化工程經核准供電之村里，其工程費用之負擔，除由臺灣省政府補助十五%及電力公司負擔五十一·七%外，其餘由用電村里負擔三十三·三%。

（農電工程完工後，因用戶用電增加而發生電力不足，其線路若須添架或擴建時，其應繳費用須調查現場用電情形後方可答復，此點請用戶逕向當地電力公司宜蘭區管理處或服務所洽辦，當能明瞭。

（農電工程村應繳清繳費後，施工時所需之人工、材料、器具、運費等概由電力公司負擔，與用戶無關。（臺電公司業務處）

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部 謹啓

牧草之王 康富利

康富利葉可做飼料也可人食，一分地收入二萬多元，比雜糧收入多五倍。

生長迅速，管理容易。產量豐富，養分也多。既可養禽，又可出售。

種苗大量供應·特價優待

中國康富利企業公司
台北市長安西路一一〇號