

### 山地果園種綠肥

#### 按其耕期選品種

【問】：我有山地種梨、荔枝，因路遠又崎嶇不平，堆肥運搬施用困難，要用綠肥代替，不知紫雲英或綠萍可否使用？或有其他更好的種類？每分地要若干種子？怎樣播種？（臺中縣新社鄉新五村車站邊王春雨）

【答】：(一)三、五月間可種植綠球大豆或越南豇豆，均採用疏疏條播，行距約一畝尺半，每公頃播種量為十五公頃。

(二)十月間可種植苕子，採用點播，每穴播種三、四粒，株距一、二畝尺，行距二、三畝尺，每公頃播種量約五公頃。

(三)如果樹基大，果樹間隙地甚少，應在塘段邊沿上種植多年生「山珠豆」。

以上所列綠肥種，請向「新社鄉大南村農林應種苗繁殖場」洽購。（張國勳）

## 蔬 菜

### 栽培莖薯宜深耕

【問】：要栽培莖薯（薯仔薯）請問其栽培方法如何？（基隆市義二路一七五號之一富貴市場內李貴）

【答】：莖薯之栽培要點如下：

(一)播種期：南部九至十一月，中北部三月至八月。

(二)土壤：砂質土。

(三)播種：土壤要深耕，畦寬一五〇公分作高畦，每畦種四行，行距三〇公分，株距二十五公分。用點播，每穴播二粒種子，十公畝播種量約四公畝。

(四)施肥：基肥每十公畝地施腐熟堆肥二千公畝，過磷酸鈣五十公畝，硫酸鉀二十公畝。撒施後鋤入土中，發芽後二個月內，如生育不良，再用豬糞尿追肥一、二次。

(五)除草及中耕：每半個月行一次，中耕不宜過深，以免傷害根部影響根球的肥大。

(六)其他管理：①發芽後約有真葉三、四葉時，行間拔每株穴留一株。②春播者，畦面敷草，以防雜草之繁茂及防止雨水沖失畦

土。③土壤乾燥時宜行灌水，但生育後期應保持土壤乾燥，以免影響根球之品質。④莖薯過旺時宜行摘心，抽苔開花時亦應摘除花枝，以助根球之肥大。

(四)採收：播種後一五〇、一八〇天可採收，採收時注意不可傷害薯塊，採收宜在土壁乾燥時施行，十公畝地產量約二千、四千公畝。

(五)貯藏：選擇病蟲害及無損傷之薯塊堆放屋內冷涼之處置草或蓋乾土貯藏，貯藏中避免潮濕以免腐爛，又高濕容易引起空心，貯藏良好時可保存六個月左右。

(六)病蟲害防治：蟲害有蚜蟲及紅蜘蛛，可用益加津八百倍液防治。病害有銹病及炭疽病，為害嚴重時會引起葉片全部枯落影響產量及品質，發生初期可用大生七十八加水四百倍液防治。（陳文郁）

## 木 林

### 桃花心木葉早整枝

#### 分枝以下應全剪除

【問】：(一)我的桃花心木與印度紫檀已造林五年，樹幹上生出分枝很多，要全數除去麼？或每距離五、六公尺處留二、三枝，作為日後打枝的立足點呢？

(二)目下情形是樹幹高而細，不能負荷一人的重量，打枝要怎樣做？需用何種工具？

(三)國有林班對這項工作，是如何進行的？（屏東春日鄉古華國校劉化之）

【答】：(一)桃花心木與印度紫檀等應及早施行打枝，以養成良好通直的獨幹木材。

(二)實行打枝不可過度，以免影響林木的生長，應適度施行。

(三)分枝以下的枝條要全除，不必留二、三枝作為日後立用。

(四)打枝工具為剪枝刀、小手鋸（套柄長木柄或竹柄）、草鏟等。站立地上或利用輕便小梯實行作業，切口必須平滑。

(五)國有林對是項工作，因經費所限，僅在無育刈草時酌行修枝而已。（林務局）

原裝進口

# 賜減多

乳劑

# スマイト



# 亞久力

一萬倍展着劑



**紅 蛛 最 新 特 效 藥**

スマイト乳劑本年度新增加推廣之紅蜘蛛藥劑。中名為「賜減多」具有下列五大優點：①スマイト乳劑2000倍對各種紅蜘蛛具有速效性，尚且有一個月以上長久持效性。②對別種藥劑已具有抵抗力之紅蜘蛛亦能獲功效。③與波爾多液及其他一般農藥均可混用。④對人畜無害。⑤物價廉，使用安全。

製造廠：兼商化學工業株式會社  
發賣元：兼商株式會社

總代理：文山企業行  
臺北市南京西路416號 電話：42203