

- ，並帶口罩、眼鏡。
- (2) 藥劑加水稀釋倍數應依照政府推廣方法的規定，千萬不可隨便提高濃度。
- (3) 施藥時站在上風，避免藥劑吹向身體。
- (4) 施藥中切勿吸煙、喝茶或吃東西，工作結束後，應即以肥皂洗淨，然後才可吃東西。
- (5) 每人每天噴藥的時間不要連續在四小時以上。
- (6) 施藥中如噴霧器發生故障，應先將藥液

農藥安全使用十則

十多年來，經驗警告我們，祇有遵守下面所說的十則，才能得到施用農藥的安全。

- 一、不要購用沒有農林廳登記的雜牌農藥：市面上大部份貪圖厚利的農藥零售商，常常販賣沒有向政府登記的雜牌農藥或成分不明的農藥。舉例來說：低毒性的「馬拉松」，每公升是約一百二十元，「大利農」三百元，「速滅松」是二百六十元，而高毒性的「巴拉松」是一百元左右。不法商人為圖利，把「巴拉松」冒充是「大利農」或「速滅松」，以較原價低的價錢賣給農友。

- 倒出，並以清水洗淨後修理，切不可直接用嘴吹通噴頭。
- (7) 施過藥劑的田間，應插立紅色標示旗，藉以提高警覺，避免人畜進入，以免引起危險。
- (8) 施業者如發生頭昏、腹痛、嘔吐、抽筋等情形，應即停止工作，並延醫治療，如係「巴拉松」等有機磷劑的中毒，可到各地農會或衛生所洽領糧食局免費供應的「巴耐」解毒注射劑。
- (9) 藥劑應放在沒有食品及兒童接觸不到的

農藥，如高

毒性的有機磷劑，如「大利農」，「速滅松」，「賽文」，「富力松」等防治香蕉粉介殼蟲。茶樹採茶期如發生害蟲應用速效而分解快的農藥，以免影響茶質，又如洋菇害蟲的防治，絕對不可應用劇毒或有餘毒的農藥。

- 三、不可任意提高使用濃度：某種農藥用在防治某種病害、蟲害，都是經過政府試驗機關試驗過，它的使用濃度更是經過田間試驗所得的結果，一般農友常常在調配藥液時任意增加原液，因而使噴射的藥液濃度增高，而使農作物在預計安全收穫期間仍有含毒成分，影響消費人的健康。
- 四、調配農藥操作時，千萬不可觸及原液：現代含毒農藥的毒性，本來已很劇烈，高濃度液祇要少量接觸到身體就被吸收，引起中毒。農友們往往忽略了這一動作，在調配藥液時總是不戴手套或口罩，因為一不小心的原液觸上皮膚或收入發散的氣味，而發生意外的中毒，所以這雖是小動作，不可不加以留意。

- 地方，最好加鎖。
- (10) 藥劑空瓶應即埋入土中，不可供為其他用途或隨地丟棄。
- (11) 對蔬菜、洋菇、香蕉及茶樹應使用政府推廣的低毒性或殘毒期間較短的農藥，並切實遵守規定的安全期收穫。
- (12) 要選購政府登記合格的農藥，不要為貪便宜購用偽劣藥。希望今年的農藥使用旺期大家能小心，不要再發生中毒事故。

五、田間噴撒農藥時需要加戴防護

毒衣具：大多數農友自以為有噴藥經驗而不戴用防護衣具，裸露身體，這樣很容易沾上藥粉，造成噴藥中毒，是

六、盛裝農藥容器不可亂棄

農藥容器有塑膠瓶、鋁瓶、玻璃瓶和紙包，其中塑膠瓶和鋁瓶兩種，因為美觀耐用，農友用藥完後，有的把瓶子帶回家，有的放在路旁，兒童學生們有的誤用來裝茶水，因此中毒。玻璃瓶裝有時破碎，農友赤脚被割破情事，時有發生，所以用完後的容器，應該特別注意加以處理，埋入地下。

七、噴藥完畢後的噴霧器和剩餘的藥液要加處理

幾年南部有一位農友，把剩餘的藥液噴在牛體上，以為可以殺治牛體上的壁蝨，那知道被噴的牛，不到半小時，四脚朝天死去。另一位農友，把剩餘的安特靈藥液，噴在自己家中防治蚊蠅，經過一個晚上，睡在裏面的全家人，都中毒了。還有一位農友把剩餘的「巴拉松」藥液倒在地上，致使行路踏沾藥液的赤脚農友中毒了。所以用藥完畢後的器具和餘液的處理要特別注意，噴霧器更要灌洗乾淨。

八、農藥應放在兒童不能接觸的

地方，最好加鎖。

九、噴藥後的農作物必須經過一定時期才收穫

即「安全收穫期」，再行收穫。含毒農藥，有的施用後分解很快，有的要延留很久而在作物體中，有的農友因為市場農產品價格高漲，希望賣高價，在農藥還沒有消散的危險期間，即予收穫，運往市場，消費人常因取食而中毒。所以農友一定要遵守政府技術人員的指導，在「安全期間」收穫，過早收穫，可能有含毒的危險。

十、田間噴藥請勿抽煙並應有適當休息

本省十多年來所發生的噴藥中毒事件，部份是噴藥的人沒有休息，技術指導告訴我們說：一天噴藥工作最多不能超過四小時，尤其噴撒有機磷劑，絕對不可抽煙，並且需要休息，連續噴藥工作是非常危險的。屏東一位農友，因為整天噴藥，中毒過深，當天中毒死亡。

如果你隔時噴藥工作，經過一定時日最好檢查血液一次，那就比較安全些。

如果你隔時噴藥工作，經過一定時日最好檢查血液一次，那就比較安全些。