

蔬菜、蕉香、菇洋、菜蔬 定規藥農用使全安

新型農藥，是第二次世界大戰後的產物，使用至今，不過二十多年歷史，如德國所發明之「富拉多」(其主要成分為巴拉松)，原為戰爭殺人之用，後因用於治蟲效果甚好，各國乃廣泛用於農業。因為此類藥劑具有劇烈毒性，如何一方面用以使農業增產，一方面保障人民安全，為當今各國農政當局使用農藥所持有的雙重目的。

蔬菜、洋菇、香蕉或茶葉等亂用農藥，很容易影響消費者的健康，這在道義上是很不應該的事，為了避免亂用農藥，引起不良後果，我們列舉各種用藥規定，敬請各位參照共同遵守：

蔬菜

- (1) 收穫前四天內，不使用任何農藥。
- (2) 蔬菜上絕對不使用劇毒性農藥：如有有機磷劑「巴拉松」及有機氯化烴劑「安特靈」乳劑等。
- (3) 「阿特靈」、「地特靈」及「飛佈達」，僅使用於種植前防治地下害蟲。
- (4) 不使用雜牌農藥及不明成份的偽藥。
- (5) 有機水銀殺菌劑「谷樂生」、「西樂生」等，僅限於種子消毒，絕對不可用作防治葉菜或果菜類的病害。
- (6) 下列低毒或速效性農藥是經農林廳推廣使用在蔬菜上的，但使用時請注意如下幾點：
 - ① 使用「馬拉松」乳劑、「魚藤精」乳劑、「大必隆」乳劑、二氯福(DDVP)乳劑及「溴磷」可濕性粉劑，採收前四天停止用藥。
 - ② 「錳乃浦」(大生二二)、「錳乃浦」(大生七八)、「錳乃浦」(大生四五)、「大生精

- 「液劑」、「加保利」(賽文)、「安收多」、「免特爛」(保利農抗病)、「可利生」等，採收前七天停止用藥。
- ③ 使用「速滅松」防治蔬菜害蟲，採收前十天應停止用藥。
- ④ 使用「益農產」在收穫前十五天停止用藥。
- ⑤ 使用「安殺番」(殺蟲淨)及DDT乳劑，採收前二十一天停止用藥。
- ⑦ 「米賜多愛」為浸透性農藥，毒性高而延毒性能長，不應使用於蔬菜上。

洋菇

- (1) 使用五百倍「錳乃浦」(大生二二)稀釋液防治褐病時，要將菇床上幼菇全部採除。
- (2) 使用「二氯福」(DDVP)防治跳蟲，應噴射菌架地面及牆角等處，勿用於菌床上。
- (3) 使用阿特靈防治螞蟻只限於噴射牆角。
- (4) 「DDT」、「福馬林」、「谷樂生M」限用於菇舍消毒。
- (5) 「必速滅」限用於覆土消毒。

香蕉

- (1) 防治蕉果上的害蟲，限用低毒性農藥。
- (2) 二十天內要收割的果實，不可噴藥。
- (3) 「阿特靈」、「地特靈」僅可噴射於蕉株假莖基部及附近上面。


茶樹

- (1) 「DDT」、「克氣茶」、「可濕性硫磺粉」、「殺也特」、「依賴得」等僅限於冬季或茶芽未萌發前使用。

蔬菜噴藥着講究！

洪汝煌

- (2) 距離採茶三星期以上時，可噴射「巴拉松」、「加保利」(賽文)、「三氣芳」(蠅敵死)。
- (3) 距離採茶期二星期以上時，可噴射「四達峯」(鐵地旺)、「開路生」、「魚藤精」。
- (4) 距離採茶期一星期以上時，可噴射「美文福」(富賜靈)、「二氣福」(DDVP)。
- (5) 距離採茶僅有一星期時，提早採摘。



① 注意農藥(和)時期，要防(治)病蟲(害)。

② 使用大(家)安(全)無(毒)農(藥)誌(故事)。