

保護洋菇，謹慎用藥！

蕭榮福

保護洋菇，應謹慎用藥，非不得已不使用農藥！同時應切記「應用農藥，安全第一！」的原則。茲提出下列數點，希望大家共同遵守：

(1) 預先做好消毒工作 這是最安全可靠之洋菇保護方法。菇舍內病蟲殘存，每為次年期病蟲的發生傳染源，早日消毒，即可殺滅病蟲，又不影響菌絲發育。他如堆肥、覆土的消毒，實在馬虎不得。

(2) 改良菇舍，防範害蟲飛入 菇舍內壁四週要光平，不留空隙，門窗加設尼龍紗網，出入口加設雙重門，避免害蟲飛入，同時改善通風設備。

(3) 依照指定施藥部位安全噴射藥劑 例如D.V.P.乳劑、谷樂生M粉劑、壁及地氈等，不可用於菌床上。他如阿特靈可濕性粉劑防治蟻類，噴射菇舍內四角落，切勿噴射牆角以外地方。千萬小心，絕不能隨意使用。

(4) 按照規定施藥，以免影響洋菇生育 例如發生褐斑病時，先將罹病區五百倍稀釋液。不然，採取食用影響健康。用量之不當，也會影響洋菇生育。

(5) 不可擅自混合藥劑 凡是農藥都有一定理化性質，不能隨便混合，不然會起化學變化，不但對病蟲無防治效果，相反的有害洋菇的生育。

(6) 調配農藥，小心用水 河川、湖泊的水常因夾雜他物，影響農藥調配。溫泉響農藥性質。即使普通用水，如果酸鹼性差異很大，也不適合用。

(7) 選用低毒農藥，切勿亂用藥劑 農藥種類很多，政府規定洋菇栽培不可有有機磷劑、或毒性長的有機氮化合物及水銀劑等。切勿圖一時防治病蟲之便而忽略了安全問題。絕對不可應用劇毒或具餘毒性的農藥。

(8) 放遠眼光，適時使用農藥 例如在洋菇上發現有瘦蠅幼蟲時，及時在菌床精一乳劑二千倍稀釋液，連續噴射三至五次，至菇蠅幼蟲消滅為止。一般菇農眼光狹小，總存着僥倖心理，以為能夠順利交菇，即可不必注意病蟲害問題，這是錯誤的想法，尤其在國際市場競爭劇烈的今日，必需養成「品質第一」的觀念。

(9) 不要購用沒有農林廳登記的雜牌農藥 市面上大部份貪圖厚利的農藥零售商，常常販賣沒有政府登記的雜牌農藥或成分不明的農藥，如果只圖一時便宜，購用偽劣農藥，有時會導致洋菇死滅，錢是花了，却收到相反效果。

(10) 不可任意變更使用濃度 某種農藥用於防治某種病害、蟲害，都是經過政府試驗所得的結果。一般農民調配藥液時常不注意，因而藥液濃度提高，不是影響消費者健康，便是毒害洋菇生長。相反的，使用濃度過低，則無法達到預期消滅病蟲的效果。



⑤ 蔬菜全安坐人多，買人(多)坐全安菜蔬(多)加卡有錢賺菜種



④ 前(天)工四成收菜蔬(天)用(妥不)通嘸藥農何任



③ 緊要上靠可藥農(緊)心小(妥)着候時購選