



獸醫

接種新城雞瘟

十二天後免疫

【問】：(一)肉雞雞養至八、九週即可出售，時間很短，注射「新城雞瘟」疫苗，應在什麼時候最適當？應注射幾次？藥量多少？注射後幾天始有免疫效力？

(二)肉雞除注射「新城雞瘟疫苗」外，還需注射其他疫苗嗎？

(三)市上所賣的「新城雞瘟疫苗」就是所謂「死毒疫苗」嗎？「活毒疫苗」在臺中市那裏可買到？

(四)雞剛買回來四天，就發現少數有白痢症狀，應如何預防？如何醫治？

(五)所養的雞隻八週齡，平均體重雖達二台斤三兩左右，但不肥，胸肉很尖，需要加添何種飼料，才能育成肥雞？

(六)最好在一個雞場購買九斤雞或哈巴種雞雞？

(七)蛋雞是那一種最好？在那個雞場可買到？(潘雲統)

【答】：(一)肉雞育成期間，要預防新城雞瘟，第一要注重衛生管理，儘量避免病毒的侵襲。預防注射如雞場未被RDC病原污染，可使用點用活毒疫苗，在四日齡及四週齡時各行一次接種。使用死毒疫苗預防，應於四週齡時接種一次則可，活毒疫苗接種量每次為二—三滴，死毒疫苗為〇·五西西。雞羣健康正常的條件之下，接種後約經十二天則可生成免疫抗體。

(二)肉雞的育成如衛生管理良好，無需使用藥物注射或經口投與。使用肥育丸注射，雖然可以促進肥育，可是育成的肉雞供人食用後，將影響人體的衛生，已由政府禁止使用。

【目前本省仍無新城雞瘟活毒疫苗供應，過去雖然有一段期間，由臺灣省家畜衛生試驗所供活毒疫苗，但經使用後，因雞場CRD污染情形嚴重，引誘CRD病害威脅雞羣，已暫時停止供售，市面上供售的均為死毒疫苗。

(四)四日齡雞有少數排泄白痢，最好請獸醫師查明病因，並請示有效防疫措施，因雞隻患病開始症狀排泄白痢者頗多，易生誤用措施，招致意外損失。

(五)八週齡重平均有二台斤三兩已經很好，胸肉尖的原因可能是因為品種不很好的關係，請仔細選擇雞種。

(六)肉雞雞的購買請參閱本刊十六卷十四期十四—十七頁。

(七)目前很多種雞場都有供應產蛋用來航雞，她們的生產能力差異不大，但有很多商標名。在有關養雞的雜誌上都有廣告，請看廣告接洽。(劉永和、黃輝煌)

豬瘟預防每年一次

豬丹毒六個月有效

【問】：(一)母豬四個月前發生弓蟲病，前窩小窩都死亡，現在再生小豬幾天後可注射弓蟲病預防針藥。(2)假使無弓蟲病而注射弓蟲病藥，對小豬的健康與發育有否影響？(3)上次曾用寶島製藥廠的「弓蟲寧」，不知其他有較好的藥品否？(4)消毒豬舍要用什麼藥較安全理想？

(五)母豬分娩後子宮發炎，注射青黴素會不會影響乳量？用什麼藥較好？

(六)1)豬瘟的預防注射，孕婦在何時注射較宜？(2)分娩後母豬幾天可以注射？(3)注射經過多久要再注射？

(四)豬丹毒預防注射和豬瘟相同否？(二)水瀨源泉村月眉巷五號蔡義旋)

【答】：(一)母豬曾患弓蟲病，生小豬

農藥牌三笠

中日合資 保證品質



服務週到 日本技師調配藥劑

得力寶水和劑粉劑

稻熱病石灰

BHC粉劑

美佳農錠劑

才才DN乳劑

其他各種農藥

三笠F洗劑

滲展素

台灣三笠化學工業股份有限公司

台灣省彰化市大竹園大竹莊145號

日本三笠化學工業株式會社合資

(本公司農藥均有登記證)