

可否打弓蟲病預防針乙節，因現尚無是項預防藥品，故預防注射是無法實施。

(2)如小豬無病，不需注射弓蟲病治療藥品。

(3)弓蟲病的治療以 Pyrimethamine 與磺胺類藥品混合使用，故買藥時要看標籤的記載或買可靠藥廠出品者為宜。

(4)豬舍消毒如使用石炭酸或來蘇水，請以百分之三十五溶液，並以新泡的消毒藥水消毒為宜。如污水汚物太多的豬舍，即要用大量消毒藥水。平常農家豬舍如能用開水（剛剛滾開的）由低向高處擦刷，可收消毒及清洗之效。

(5)據本人經驗豬弓蟲病之發生，受環境、氣候及營養等關係至大，如突然改變飼養或感荷等，可能誘發該病。所以注意飼養管理並好好作豬瘟預防注射（因最近小豬之死亡受豬瘟感染殊多）是很重要的。

(1)生產後子宮發炎，可用青黴素或金黴素等抗生素藥品，乳量不受影響，受影響的是子宮炎本身影響乳量。另外腐敗藥品及局部之消毒處理均可改進子宮炎。

(2)母豬產中避免作預防注射，不過附近若有豬瘟發生而做緊急處理時可以注射，但需注意不要粗動母豬，以免機械的加重產的原因，本省很多母豬在妊中期間已注射很多，但很少聽到發生意外。

(3)預防注射一次可維持一年之效力，故每生二次仔豬注射一次，可確保母豬安全，希望切實實施，可使養豬賺錢。

(4)母豬丹毒預防注射效力較短，故每六個月作一次為宜。（林本欽）

春秋兩作皆有發生，而主要發生在玉米生育後期。發病初期葉面生出青色斑，其後漸次擴大為青灰色，病斑大為 1.5x1.5cm，病斑型為粉粒型，周圍為褐色，中央稍暗色，其上有天鵝絨狀之絨毛（分生子孢子），木病由病斑上之分生子孢子傳染。

防治方法：自發生初期，每十天噴射大生 M 22 四百倍液一次，每十公畝噴射藥液量一百二十公升，噴射於玉米葉上下兩面。（張松壽）

防止果實破傷

減少柑桔虎斑病

【問】：我種有柳丁百餘株，三年生甚健旺，今年已結果，但常見有臍部變黃而落果，茲寄上病果標本請鑑定是何病，並指示防治法。（佳里郵局黃金傳）

【答】：所寄來的標本為柑桔虎斑病，發病原因多為風雨的吹襲，使果實受傷，或因昆蟲類為害，使油胞破裂，因而使果皮發生灰色病斑及黃化現象。並非由病原菌所引起。易生此病的柑桔品種有脐橙、夏橙及溫州蜜柑等。

防治法：(1)選擇風少之地方栽培或設置防風林。(2)摘果時避免在雨濕或露濕時行之。(3)果園工作時避免擦傷果實。(4)貯藏果實時宜略為晒乾。(5)防除害蟲。（曾慶德）

樹果

介壽果營養豐富

栽培經濟價值高

【問】：(一)介壽果（腰果）有無栽培經營價值？目前臺灣推廣情形怎樣？會不會走上供過於求的情形？種子從何處可以買到？

(二)何處出售板栗優良苗木？豐年何期介紹板栗栽培法？

(三)梧桐前途如何？（花蓮縣光復鄉大富二九號陳清社）

【答】：(一)介壽果用途很大，宴席上所吃者為其種子部份，俗稱腰果仁，營養豐富，含蛋白質十八%，澱粉八·九%，脂肪

害蟲病


防治玉米煤紋病

每十天噴大生一次

【問】：附上玉米藥病害標本，請問這是什麼病？如何防治？（苗栗縣苑裡鎮為公路三十八號鄭柱杜）

【答】：所寄玉米標本是玉米煤紋病


介壽果營養豐富，栽培經濟價值高。目前臺灣推廣情形良好，不會供過於求。種子可向各地農會或農校購買。板栗優良苗木可向各地農會或農校購買。梧桐前途光明，應加推廣。



維多 A

(登記九八二)


防治：蔬菜露菌病、蕃茄及馬鈴薯晚疫病、葱韭赤銹病、大豆銹病



因克靈 80

(登記七五七)

防治：水稻浮塵子、飛虱、柑桔蔬菜殺蟲劑



因克命 80

(登記九三七)

品質可靠之錳乃浦 (MANEB)

防治：香蕉葉斑病、葱韭赤銹病

Sariaf S.p.A. FAENZA

意大利 沙利富化工廠 出品

欣興股份有限公司 進口

地址：臺北信繁3080

和豐農化廠股份有限公司 總經銷

彰化縣和美鎮彰新路五號

乳劑	46.6%	(1070)
乳劑	50%	(1071)
乳劑	50%	(1053)
乳劑	40%	(1052)
乳劑	50%	(1054)
乳劑	6.5%	(1018)

品質可靠！

藥效良好！

和豐 松谷 乳劑

豐安 谷樂 乳劑

安治 樂樂 乳劑

必必 淨淨 乳劑

滅枯 速速 乳劑

登記

品質可靠！

藥效良好！