

蔬菜主要病蟲害防治方法

秦 登

蔬菜病蟲害的種類很多，農藥的種類也日新月異，農友們對於病蟲害的識別和農藥的選擇常有困難。下面是蔬菜主要病蟲害的種類、為害情形和防治方法，列表以供農友查閱參考：

(一) 病害

病名	徵	防治	方法
番茄晚疫	侵害葉、莖、果實各部。葉病斑暗紫色或灰綠色水浸狀，多雨腐敗。莖病斑、暗褐色。果實病斑上發生白色微細內部出現雲紋。	前七天停止用藥 錳乃浦(大生M-22) 四〇〇倍 錳乃浦(大生Z-78) 四〇〇倍 大生精液劑 五〇〇倍 前七天停止用藥	收穫 收穫 收穫 收穫
番茄早疫	侵害葉、莖、果實各部。	同右	收穫
瓜類白粉	侵害葉片、葉柄、及莖部。病斑表面產生麵粉狀白色粉末，漸變成灰色，其上並生黑色小顆粒。	以可利生加水一〇〇〇—一五〇〇倍	防治
瓜類露菌	侵害葉部。病斑初為淡黃色，小斑點，後擴大而呈淡褐色。反面生暗灰色微。	錳乃浦(大生M-22) 四〇〇倍 前七天停止用藥	收穫
瓜類炭疽	侵害葉、莖、果實。病斑葉上初為淡黃白色漸變褐色而形有同心圓紋。果實病斑色而色，並分泌橙紅色黏質物。	一、以錳乃浦(大生Z-78)可濕性粉 二、摘除被害果葉燒毀。	收穫 收穫

牌 卦 八

證 保 質 品 ● 藥 農 台 裕

商 標



註 冊

原裝進口
加配各種農用藥劑

裕台企業股份有限公司農化工業廠

廠址：彰化市西門和平里十五號·電話：三〇四四

總公司：台北衡陽路六十四號

最新葉面營養劑

菩薩露



德國原裝一公升裝

現貨供應

你想增加水稻·瓜豆·果蔬·花卉的產量嗎？

請採用「菩薩露」必可得滿意的效果，比地

下施肥大5-10倍。稀釋300倍無毒無藥害

，可適用於各種季節地區。

施用於水稻，可以增強抵抗稻熱病！

總經理：正豐化學工廠 臺中霧峰
股份有限公司 草湖路二號

(未完，下期續)

瓜類莖割病	白葉露菌病	洋蔥紫斑病(黑斑)	葱赤銹病
侵害莖及根，地際之莖內部枯死變褐，全株萎凋，細根腐朽，只剩主根。莖側發生縱裂痕，並分泌膠質物。	病斑發生在葉上莖葉。初為紫色不規則斑點，後漸擴大為灰微狀。葉表面呈黃色病斑，反面	發生於葉及花莖。病斑初為橢圓形或紡錘形，淡褐色，並生煤狀同心輪。	發生於葉、莖。初在表面形成橢圓形或紡錘形，略隆起病斑，其中部橙紅色，後縱裂露出黃赤色的粉末夏孢子堆
施美濃乳劑一、〇〇〇倍(播種前三天植穴灌注二公升)開花前及果實生長各在根旁灌注一公升	前七天停止用藥	六斗式波爾多液加展着劑	(1) 鋅乃浦四〇〇倍 鋅乃浦(大生四五)五〇〇倍 (2) 加展着劑
收祿生乳劑六五〇〇倍可濕性粉劑	前七天停止用藥	錳乃浦(大生Z-78)四〇〇倍	收稔
收祿生乳劑六五〇〇倍	錳乃浦(大生M-22)四〇〇倍	錳乃浦(大生Z-78)四〇〇倍	收稔

害蟲名	特	徵	為害情形	防治	方	法
斜紋夜盜	幼蟲初齡與老齡色彩不同，斑紋亦不同。葉背線、亞背線、氣肉殘留表皮，成蟲(蛾)體翅皆褐色，前翅有斜走的白食全葉。	幼蟲灰褐色，無斑紋幼蟲白日匿於土內，夜出為害作物，幼蟲則暗取葉片拖食。	初齡幼蟲羣棲葉裏，剝食葉肉殘留表皮，成長後晝伏夜食全葉。	探收前四五天停止用藥	五〇〇〇倍，探收前廿一天停止用藥	三五〇〇倍安殺番(殺蟲淨)乳劑一、〇〇〇倍，探收前廿一天停止用藥
切根蟲	幼蟲灰褐色，無斑紋幼蟲白日匿於土內，夜出為害作物，幼蟲則暗取葉片拖食。	幼蟲灰褐色，無斑紋幼蟲白日匿於土內，夜出為害作物，幼蟲則暗取葉片拖食。	幼蟲白日匿於土內，夜出為害作物，幼蟲則暗取葉片拖食。	防治法與斜紋夜盜蟲同		