

最新葉面營養劑

菩薩露



德國原裝一公升裝

現貨供應

你想增加水稻·瓜豆·果蔬·花卉的產量嗎？

請採用「菩薩露」必可得滿意的效果，比地

下施肥大5-10倍。稀釋300倍無毒無藥害

，可適用於各種季節地區。

施用於水稻，可以增強抵抗稻熱病！

總經理：正豐化學工廠 臺中霧峰
股份有限公司 草湖路二號

瓜類莖割病	白葉露菌病	洋蔥紫斑病(黑斑)	葱赤銹病
侵害莖及根，地際之莖內部枯死變褐，全株萎凋，細根腐朽，只剩主根。莖側發生縱裂痕，並分泌膠質物。	病斑發生在葉上莖葉。初為紫色不規則斑點，後漸擴大為灰微狀。呈黃色病斑，反面	發生於葉及花莖。病斑初為橢圓形或紡錘形，淡褐色，並生煤狀同心輪。	發生於葉、莖。初在表面形成橢圓形或紡錘形，略隆起病斑，其中部橙紅色，後縱裂露出黃赤色的粉末夏孢子堆
在根旁灌注一公升 收祿生乳劑六五〇〇倍 八〇〇倍 克壤土乳劑六五〇〇倍	前七天停止用藥 錳乃浦(大生M-22) 四〇〇倍 錳乃浦(大生Z-78) 四〇〇倍	錳乃浦(大生Z-78) 四〇〇倍 六斗式波爾多液加展着劑	(1) 錳乃浦四〇〇倍 錳乃浦(大生四五) 五〇〇倍 (2) 加展着劑
施美濃乳劑一、〇〇〇倍(播種前三天 植穴灌注二公升) 開花前及果實生長各 收祿生乳劑一公升	錳乃浦(大生Z-78) 四〇〇倍 收穫 錳乃浦(大生M-22) 四〇〇倍 收穫	錳乃浦(大生Z-78) 四〇〇倍 收穫	

害蟲名	特	徵	為害情形	防治	方	法
斜紋夜盜	幼蟲初齡與老齡色彩不同，斑紋亦不同。葉裏有背線，亞背線、氣肉殘留表皮，成蟲(蛾)體翅皆褐色，前翅有斜走的白食全葉。	幼蟲灰褐色，無斑紋幼蟲白日匿於土內，夜出為害作物，幼蟲則暗取葉片拖食。	初齡幼蟲羣棲葉裏，剝食葉肉殘留表皮，成長後晝伏夜食全葉。	五〇〇倍，採收前廿一天停止用藥 三〇〇倍，採收前廿一天停止用藥 二〇〇倍，採收前廿一天停止用藥 採收前四天停止用藥	二五〇〇 三五〇〇 五〇〇〇	DT乳劑三〇〇 DT乳劑一五〇〇
切根蟲	幼蟲灰褐色，無斑紋幼蟲白日匿於土內，夜出為害作物，幼蟲則暗取葉片拖食。	幼蟲灰褐色，無斑紋幼蟲白日匿於土內，夜出為害作物，幼蟲則暗取葉片拖食。	幼蟲白日匿於土內，夜出為害作物，幼蟲則暗取葉片拖食。	防治法與斜紋夜盜蟲同		

(未完，下期續)