

(三)核桃的根有毒性，但並不是不適所有植物生長，至於混植懸風草和營多藤，因尚無經驗效果不詳，無妨試栽。

梅等耐粗放栽培的果樹，此等果實適於加工，現在或以後銷路頗為觀。（講克終）

可施大生防治

【問】：(木瓜果實外皮，滿佈黃褐色小斑點，形狀如成熱的芝蔴，在尚未成熟時，斑點中間似有白色漿液流出，是何原因？到成熟時斑點並不消失也不擴大。

(一)果實外皮約有五分之一黃色時，是否可採收，或待其自然成熟？採下後，有否方法可使其提早成熟？(因在樹上果實成熟時常被鳥啄食，損失殊多) (臺北永和鎮安樂路一九二巷廿二號之三朱炳煌)

【答】：本頁果實外皮有黃褐色斑點，多發生在冬季到春季，可自開花後用「大生七」一百倍稀藥水，每隔二十四週撒佈一次，果實收穫熟度可參考本刊第十七卷第一期農業情報解答。促進果實成熟，可用少量石灰加水置入存放果實容器中並行密封，或將果實裝在地面行覆石處理後以膠布密封。（戴邦本）

檸檬用苦柚酸桔最優

【問】：(一)現時本省苗圃大多用廣東檫、酸柑、苦楝等做砧木，請問爲了經濟栽培，該選用何砧木爲宜。

（一）雖是好砧木，可是找不到，未知何處有，如果要自行繁殖用何方法？
（二）枳殼與酸桔可以做檸檬砧木嗎？優劣如何？

四、說柑能做檸檬砧，其他甜橙品種

實生苗（如吉發盛金剛等）是否可作？

（五）晚霜西亞嫁接印子柑，在幼株期果實品質較差，未知此現象是暫時性？還是永久性？

(六)現在多數苗圃用廣東檸檬和酸桔作甜橙砧，爲了經濟栽培應選用何砧爲宜。

（內砂壤土，水位很淺的場所，可否栽植
吉發、虛金剛等？（屏東縣萬巒鄉疏黃村光
復路三七號郭維藩）

【答】：(一)檸檬的砧木在本省北部和高冷地以酸桔，中南部和東部以苦柚爲最理想。廣東檸檬砧之檸檬，幼株時期生長尚旺，惟無老齡株可作參考，壽命及成樹之生長狀況不詳。

(二)枳殼砧除適「里斯本檸檬」品種以外，其他均不適。

(三)在木省不易尋找，繁殖法普通採用實生法。

因缺乏資料無法報告，如雪柑可作為砧木，
由於雪柑和檸檬之生長狀況如何問題，
唐金成、陳西雄等證類實生苗亦該可作，
害發成株之樹勢雖旺，但實生苗發育甚差。
（晚霜西亞作為印子柑之砧木，生長旺
盛，初結果實（幼株）品質劣，惟至成樹，
樹勢穩定後果實品質即復原。

此對於甜欖類之砧木，廣東檳榔、酸桔等親和力均良好，其中廣東檸檬砧者初期生長雖較旺盛，到達結果時期可提早，但砧穗間之親和力不如後者之良好，可能影響樹命

(四) 枳殼與甜橙之親和力頗劣，不適作爲砧木，尤其冬季氣溫暖，無法致枳殼休眠之本省更不適採用。

穴地下水位高處，不適種柑桔類。(翁)

藥物作用藥

射干須培土摘花

成品每斤七十元

【問】：我在今春承好友贈送中藥「射干」數十株試種，成長情形堪稱良好，今有數點疑慮敬請賜覆！

水 田 的 殺 草

您知道 農藥登記證 346 號

 **2,4-D** ソーダ塩 除草劑

日 本 原 裝 進 口

——即將大量供應——

1. 可用於水田，麥作及畑地（甘薯、落花生、蔬菜之空閑地）之除草。
2. 可與殺蟲劑混合使用，增強殺蟲効力（本田二化、三化螟蟲，浮塵子其他蟲害）兼本田除草。
3. 可用於促進農作物之生長，農友能自家配製植物荷爾蒙劑，能節省許多開支。

說明書函索即寄・請付郵票一元

石原產業株式會社

總代理：大豐農藥股份有限公司
臺北市永綏路八號 電話34703・37831

現貨供應處：臺灣吉本農化企業社
臺中市西區柳川西路152號