蔬菜主要病蟲害防治方法

秦登

（完續）

害蟲	特徵	爲害情形	防治方法
葱蚜	成蟲、稚蟲全體均呈暗紫色。	成蟲稚蟲均吸食葱葉養分，且葱變黃色，誘發露菌病。	五〇%馬拉松乳劑加水一千倍，採收前四天停止用藥。五〇%魚藤精乳劑加水二五〇—五百倍，採收前四天停止用藥。二五%溴磷乳劑（尼殺松）一千倍採收前四天停止用藥。四六•五%大必隆乳劑一千五百倍採收前七天停止用藥
豆蚜	體黑色，角狀管頗長與尾片同爲黑色。	成蟲稚蟲羣棲於寄生之葉莖等部爲害吸食養分。	
葱薊馬	稚蟲全體淡黃色，腹部帶綠色，前胸背面有淡褐色斑紋二個。成蟲黃色乃至暗黃色，無斑紋，四翅細長，如楫，各翅後緣生長毛。被害部後緣生長而呈現白色斑點。	成蟲稚蟲均在葉面加害。	
臺灣守瓜	幼蟲淡黃色有胸脚三對，無腹足，多橫皺，成蟲長橢圓形，黃褐有光，翅大於前胸，方寬，上有橫溝一條，方密布點刻。	幼蟲在中食害瓜果，成蟲食葉，致葉成網狀。	五〇%加保利可濕性粉劑加水五百—一千倍防治。
瓜果蠅	幼蟲爲白色的小蛆僅口器黑色。成蟲中胸背內部有黃色縱線三條，背上有黃色斑，翅黃褐色。	雌蟲產卵於瓜果內，孵化後在內部蛀食，被害部腐爛。	開花結果後，每五—七天，噴射二五%馬拉松可濕性粉及蛋白質水解物四百倍稀釋液至採收完畢前七天爲止，不必全株噴藥
豆莢椿象			五〇%速滅松乳劑二千倍，採收前十天停止用藥。五〇%二氯福乳劑二千倍，採收前十天停止用藥
紅蜘蛛			一八•五%開路生可濕性粉五百倍

民豐牌農藥

民豐牌

預祝年年大豐收

各種病蟲害之防治

民豐松　稻熱寶　福斯靈　加倍米　蟲敵　掃蟲寧　淨蟲寶　新加收銀

民豐化工廠股份有限公司

公司：台中縣大肚鄉中和村中山路10之6號3樓 電話：烏日局106•107號

工廠：台中縣大里鄉內新村內新路72號之6　電話：8145號

小菜蛾	幼蟲淡綠色，體中央膨大，兩端漸尖細，體表有疣狀紋數十個（上生細毛），成蟲（蛾）灰褐色，前翅後緣有黃白色波狀紋。	初齡幼蟲，棲葉裏，食成白色斑紋，不能穿孔。	八〇%大利農乳劑一千五百倍，採收十四天前殺滅幼蟲三五%安殺番（殺蟲淨）乳劑一千倍五〇%二氯福乳劑一千倍採收四天前殺滅幼蟲六四•五%大必隆乳劑一千倍，採收四天前殺滅幼蟲五〇%益農產乳劑一千倍，採收前十五天停止用藥。
菜螟	幼蟲背面有褐色縱線五條，成蟲（蛾）全體灰色，前翅略帶黃色，翅上有波狀帶紋及弓狀帶紋各一條，中室外側有暗環狀紋。	幼蟲潛入菜心或葉柄內食害，蟲糞堆積孔外。	五〇%二氯福乳劑一千倍，採收前四天停止用藥三五%安殺番（殺蟲淨）乳劑一千倍，採收前二十一天停止用藥六四•五%大必隆乳劑一千倍，採收前四天停止用藥
臺灣紋白蝶	幼蟲綠色，體上多橫皺背線及氣門線皆橙黃色。成蟲（蝶）體翅皆白色，前翅之翅頂黑斑二、三個，中央有同色之圓紋二個，後翅前緣有黑紋一個。	幼蟲加害十字花科蔬菜的葉面。	以二五%DDT乳劑加水三百｜五百倍防治。收穫前廿一天停止用藥五〇%二氯福乳劑一千倍，採收前四天停止用藥
擬尺蠖	幼蟲前端較細，後端較粗，第三、四腹節無腹足，故步行似尺蠖。成蟲灰褐色，前翅中央有銀白色斑，又稱銀紋夜蛾蟲。	幼蟲嚙食白菜廿藍等十字花科蔬菜的葉片。	六四•五%大必隆乳劑一千倍，收穫前四天停止用藥五〇%二氯福乳劑一千倍，採收前四天停止用藥
黃條葉蚤	幼蟲，體細長，淡黃色有胸腳三對，及微小之尾腳一對。成蟲（甲蟲）前翅中央有略呈波狀之黃白色大形縱紋一條，後腿粗大，善跳躍。	幼蟲嚙食根部及蘿蔔外表成蟲剝食菜葉點點成斑。	二五%DDT乳劑四百倍，採收前廿一天停止用藥三五%安殺番（殺蟲淨）乳劑一千倍五〇%馬拉松乳劑六百倍，採收前四天停止用藥五〇%加保利可濕性粉劑五百｜一千倍，採收前七天停止用藥
偽菜蚜	體暗黃綠色，體短圓，背面有淡褐色小點，微有臘粉，腹管與尾片略等長。	成蟲稚蟲吸食菜株養分並傳染毒素病。	五〇%馬拉松乳劑加水一千倍，採收前四天停止用藥五〇%魚藤精乳劑加水二五〇｜五百倍，採收前四天停止用藥二五%溴燐乳劑（尼殺松）一千倍採收前四天停止用藥六四•五%大必隆乳劑一千五百倍採收前七天停止用藥

日產★農藥

農藥登記證第851號

日產 益農產 乳劑



益農產可殺死——

蔬果・水稻・什糧等各種害蟲，最新藥劑

特點→低毒・速效・適要範圍最廣

日星實業股份有限公司
台灣日產化工股份有限公司
台北市南京西路五號之一　電話：59961～4