

# 蔬菜主要病蟲害防治方法

(完續)

秦登

害蟲	特 徵	為害情形	防 治 方 法
葱蚜	成蟲、稚蟲全體均呈暗紫色。	成蟲稚蟲均吸食葱葉養分，誘發露菌病。	五○多馬拉松乳劑加水二千倍，採收前四天停止用藥 五○多魚藤精乳劑加水二五〇—一五〇倍，採收前四天停止用藥 二五多溴磷乳劑(尼殺松)一千倍採收前四天停止用藥 六四藥五天必隆乳劑二千五百倍採收前七天停止用藥
豆蚜	體黑色，角狀管頗長，與尾片同為黑色。	成蟲稚蟲均棲於寄生之葉莖等部為害吸食養分。	五○多馬拉松乳劑加水二千倍，採收前四天停止用藥 五○多魚藤精乳劑加水二五〇—一五〇倍，採收前四天停止用藥 二五多溴磷乳劑(尼殺松)一千倍採收前四天停止用藥 六四藥五天必隆乳劑二千五百倍採收前七天停止用藥
葱薊馬	稚蟲全體淡黃色，腹部帶綠色，前胸背面有淡褐色斑紋二個，成蟲無斑紋，四翅暗黃綠色，各翅後緣細長，如毛。被害部枯死而呈現白色斑點。	成蟲稚蟲均在葉面加害。	五○多馬拉松乳劑加水二千倍，採收前四天停止用藥 五○多魚藤精乳劑加水二五〇—一五〇倍，採收前四天停止用藥 二五多溴磷乳劑(尼殺松)一千倍採收前四天停止用藥 六四藥五天必隆乳劑二千五百倍採收前七天停止用藥
臺灣守瓜	幼蟲淡黃色，有胸二三對，無腹足，多橫皺，成蟲長橢圓形，黃褐色，有光，翅大於前胸，方寬，翅上有橫溝一條，密布點刻。	幼蟲在中食害瓜果，成蟲食葉，致葉成網狀。	五○多馬拉松乳劑加水二千倍，採收前四天停止用藥 五○多魚藤精乳劑加水二五〇—一五〇倍，採收前四天停止用藥 二五多溴磷乳劑(尼殺松)一千倍採收前四天停止用藥 六四藥五天必隆乳劑二千五百倍採收前七天停止用藥
瓜果蠅	幼蟲為白色的小蛆，僅胸腹兩節，口器黑色，成蟲中胸僅背上有黃色縱線三條，翅黃褐色。	雌蟲產卵於瓜實內，孵化後在內部蛀食，被害部腐爛。	五○多馬拉松乳劑加水二千倍，採收前四天停止用藥 五○多魚藤精乳劑加水二五〇—一五〇倍，採收前四天停止用藥 二五多溴磷乳劑(尼殺松)一千倍採收前四天停止用藥 六四藥五天必隆乳劑二千五百倍採收前七天停止用藥
象鼻青椿	幼蟲為白色的小蛆，僅胸腹兩節，口器黑色，成蟲中胸僅背上有黃色縱線三條，翅黃褐色。	雌蟲產卵於瓜實內，孵化後在內部蛀食，被害部腐爛。	五○多馬拉松乳劑加水二千倍，採收前四天停止用藥 五○多魚藤精乳劑加水二五〇—一五〇倍，採收前四天停止用藥 二五多溴磷乳劑(尼殺松)一千倍採收前四天停止用藥 六四藥五天必隆乳劑二千五百倍採收前七天停止用藥
紅蜘蛛			五○多速滅磷乳劑二千倍，採收前七天停止用藥 五○多氣福乳劑二千倍，採收前十天停止用藥 一八·五多開路生可濕性粉五百倍

## 民豐牌農藥



民豐牌

### 各種病蟲害之防治

民豐松 稻熱寶 福斯靈 加倍米 蟲敵 掃蟲寧 淨蟲寶 新加收銀



預祝年年大豐收

民豐化工廠股份有限公司

公司：台中縣大肚鄉中和村中山路10之6號3樓 電話：烏日局106·107號

工廠：台中縣大里鄉內新村內新路72號之6 電話：8145號