小菜蛾	菜螟	臺灣紋白蝶	擬尺蠖	黃條葉蟲
幼蟲淡綠色，體中央膨大，兩端漸尖細，表有疣狀紋數十個，生細毛，成蟲（蛾）上體灰褐色，前翅有黃白色波狀紋。後緣穿孔。初齡幼蟲，葉裏食成白斑紋，不能	幼蟲綠色，體上多橫皺，背面有褐色縱條，成蟲（蛾）全體黃綠色，略帶波狀紋。五翅灰色，前翅有各環狀紋，側帶一條，中室弓外狀紋。幼蟲潛入菜心或葉柄內食害，堆積孔外。	幼蟲綠色，體上背線及氣門線皺成蟲（蝶）體背黃色，翅白色，前翅之前緣有黑紋二個，中央有黑斑二個，頂端同色之圓紋一個。幼蟲加害十字花科蔬菜的葉。	幼蟲前端較細，後端較粗，第三、四腹節無腹足，故步行似尺蠖。成蟲灰褐色，前翅中央有銀白斑，又稱銀紋夜盜蟲。幼蟲嚙食白菜甘藍等十字花科蔬菜的葉片。	幼蟲，體細長，淡黃色，有小尾卵一對，成蟲及幼蟲嚙食根部前翅中央有黃白色波狀紋，略呈縱條，善跳躍。後腿粗大。幼蟲嚙食蘿蔔外表成點剝食菜葉成點。
六〇%利農乳劑一千五百倍，採收十四天。四%安殺番（殺蟲淨）乳劑一千倍，採收前殺滅幼蟲，三五〇%福乳劑一千倍，採收四天。五〇%前殺滅幼蟲，六四%大必隆乳劑一千倍，採收十四天。四%農產乳劑一千倍，採收前	五〇%二氯福乳劑一千倍，採收前四天。三五%安殺番（殺蟲淨）乳劑一千倍，採收前十一天。四%安止用藥，二五%DDT乳劑加水三百—五百倍，防治。收穫前廿一天停止用藥。	五〇%二氯福乳劑一千倍，採收前四天。五〇%止用藥	六四%大必隆乳劑一千倍，收穫前四天。五〇%二氯福乳劑一千倍，採收前四天。五〇%止用藥	二五%DDT乳劑四百倍，採收前四天。四五%停止用藥，五〇%加利可濕性粉劑五百—一千倍，採收前七天。五〇%馬拉松乳劑六百倍，採收前四天。五〇%止用藥

僞菜蚜	蚜尺蠖	蚜蟲
體暗黃綠色，背面有淡褐色小點，腹管與尾片略有臘粉，微長。	成蟲稚蟲吸食菜株養分並傳染毒素病。	五〇%馬拉松乳劑加水一千倍，採收前四天。五〇%魚藤精乳劑加水二五〇—五百倍，採收前四天。四%滴滴涕（尼殺松）乳劑一千倍，採收前四天。四%大必隆乳劑一千五百倍，採收前七天。四%止用藥

日產★農藥

農藥登記證第351號

日產益農產乳劑

益農產之毒性（經口毒性）



益農產可殺死——

蔬果・水稻・什糧等各種害蟲，最新藥劑

特點→低毒・速效・適要範圍最廣

日星實業股份有限公司

台灣日產化工股份有限公司

台北市南京西路五號之一　電話：59961～4