



農葉信箱

畜產

母羊乳汁不足

可用奶粉代替

【問】：(一)我飼養一頭雜種母羊(山羊與肉羊交配所生)，已產二頭小羊，但產了兩天，母羊乳汁不足，請問如何才能使母羊乳汁充足。

【答】：(一)據說：如母羊乳房旁邊長有小乳房者，該母羊的乳汁一定不多，甚至沒有，是事實？

【答】：(一)目前，兩頭仔羊沒有足夠的乳汁吃，想以脫脂奶粉代替，是否可以？或有何更好的方法？(臺北縣北投鎮中央北路二段一六六號陳倉吉)

【答】：(一)母羊在正常發育情形下，其生產後的奶量應該足夠小羊哺吮，惟如初生後母羊如果配種過早，或是妊娠期中草量缺乏營養不良時，可能影響其產奶量。目前補救辦法除每日應多給青草外，傍晚應加餵精料二、三百公克(約半臺斤)。

(二)母羊乳頭是一對，但往往有些母羊除一對正常乳頭外，在乳頭附近還有小乳頭，這小乳頭並不分泌乳汁，對於母羊產乳能力似無直接關係。

(三)目前補足小羊飲乳辦法，可以用脫脂奶粉代替，以人工飼養法餵養。脫脂奶粉調製方法：即用一份脫脂奶粉和八份溫水混和均勻，後餵之，水溫約三十七至三十八度C，每天餵二—三次，每次給量不宜過飽，以免引起下瀉。(林誠華)

清潔消毒猪舍

預防猪皮膚病

【問】：(一)母猪皮膚上發生瘡疤，同時有濃厚之膿。有發癢現象究竟何病？應服何藥(雖請獸醫診治無法查明病症)？

(二)母猪經生產一次，但以後曾交配三次皆不能受孕，是何原因？(新竹新埔鎮寶石里三十一號劉永同)

【答】：(一)據來信說母猪皮膚發生瘡疤，有濃厚的膿，但缺少詳細情況，(瘡是很大塊或小塊，發生多或少等)很難猜想。可能是膿疱性皮膚炎。一般來說仔猪皮膚柔軟較易感染，發生較小的瘡，易於破裂排膿。成猪皮膚堅硬，發生很大的瘡，不容易破裂排膿。起因為連鎖菌或葡萄球菌，不潔的猪舍容易發生。生瘡初期，患部紅丘疹時，應注射配尼西林等抗生素消炎，並擦碘酒或抹抗生素軟膏。如果已化膿，須要等待軟化後，將其切開排膿，並以一二%克來蘇液沖洗，再塗紅藥水或抗生素軟膏，即可治好。預防法：經常洗淨猪舍地面及舍壁，並以三—五%克來蘇消毒。

(二)母猪經一次生產後配三次均未受孕的原因：

(1)是否公猪無精子或精子活力減退，(請調查同時配種的其他母猪受孕狀況，就知道理)。

(2)母猪腦下垂體前葉賀爾蒙中之黃體生成激數(FH)不足，致不排卵或排卵延遲，乃至卵變腫了，均不會受孕。

(3)黃體素分泌不足所致之妊娠着離困難。

(4)子宮內膜炎或膈炎。

治療：有子宮內膜炎者應先治療，賀爾蒙不足者可在次期發情開始時注射CHG製劑(FH)。配種後(一—二日後)注射黃體素一二次(二十至四十公絲)(張聯欣)

農藥牌三笠

中日合資

保證品質



服務週到

日本技師調配藥劑

得力寶水和劑粉劑

稻熱病石灰

BHC粉劑

美佳農錠劑

才才DN乳劑

其他各種農藥

三笠F洗劑

參展素

台灣三笠化學工業股份有限公司

台灣省彰化市大竹里大竹莊145號

日本三笠化學工業株式會社合資

(本公司農藥均有登記證)