

# 農友經驗



## 我種茄子的經驗


有很多農友都栽培茄子，但茄子的生長期間，常常碰到下雨以致死亡。下面我有一點種茄子的經驗，現提出給各位做參考：

即茄子種植後約四、五天時，即開始施少許的草木灰，施放在頭部，到茄子培土時則可先將大量的草木灰施放在莖部，如此不僅可使土壤空氣流通，減少病蟲害發生，而且可增加開花結實數，延長採收時期。（宜蘭縣冬山鄉柯林村三十七號邱秀突）

## 如何防治果蠅

果蠅對各種果實及瓜類是一種最嚴重的害蟲，因為常常受了果蠅的加害，使各種果實或瓜類未成熟就腐爛落果，影響品質收量，使生產者受很大的損失。過去曾有人利用甲基丁香油誘殺雌性果蠅，及噴射蛋白質水解劑混合二五多馬拉松可濕性粉劑防治雌性果蠅，雖也有相當效果，但因前記藥類價錢很貴（甲基丁香油時價每磅四百元左右），或農村偏僻地方對購藥不方便，又因使用前記方法防治會殺死小部份益蟲及麻煩太多，使防治不能發揮十分效果。現在我願將過去經驗陳述於後，各位農友不妨一試；即利用臺灣俗稱「九層塔草」（九層插）（常用以煮田螺及加香味者

來誘殺雌性果蠅。  
（一）捕殺法（用人工兔加用藥類的辦法）  
將九層塔草剪下其枝葉三四枝，放入塑膠袋內，用手輕輕揉軟（不可液染到袋外），後張開袋口放置果樹枝上或瓜葉上（避日光直射），即時就可見到果蠅潛入袋內吸食，待看果蠅多時，即用手將袋口掩堵，壓死袋內果蠅，再將袋口張開放置，約五十分一次，每次可以壓死六十至一百隻，塑膠袋，自信封大以上就可以使用，或利用肥料袋內的塑膠袋將袋中間剪開四個一寸半徑口，袋內下面縛用鉛線或升絲片弓張，投入九層塔草後上面縛住吊掛在果樹枝，用手揉軟袋內九層塔使之發出香味，果蠅就潛入，見其情形用手對四個口掩堵壓死袋內果蠅。



果的死亡  
袋將袋中間剪開四個一寸半徑口，袋內下面縛用鉛線或升絲片弓張，投入九層塔草後上面縛住吊掛在果樹枝，用手揉軟袋內九層塔使之發出香味，果蠅就潛入，見其情形用手對四個口掩堵壓死袋內果蠅。

（二）誘殺法（九層塔草加用殺蟲劑）  
用九層塔草枝葉，加入少量殺蟲劑（市面各雜貨店農藥房均有出售，每罐二元），可分十至二十次，或地特松粉劑（農藥行有售）一公分作十餘次，每次九層塔七、八枝投入塑膠袋內揉軟，使其均勻配合後取出（免用袋）只將九層塔分開，每一處掛二、三枝於樹枝上或瓜葉上，就很快看見四方飛來的果蠅吸食後落死在地面。

（三）方法均每公頃置二、三處就

好，時間是每日早上約五點半以後（太陽未出以前）使用最適當，所掛位置最好避日光直射以防九層塔乾燥。（嘉義縣竹崎鄉義仁村內坑十三號鄭鴻鏞）



鄭鴻鏞用九層塔草殺果蠅

## 木薯塊根的處理

木薯塊根中，含有氰酸毒素，有些農友往往把未經曬乾或沒有浸水蒸熟的木薯簽拿來餵家畜，如此便經常會有中毒的現象發生，茲把使用木薯作飼料應注意的事項說明於後，供農友們參考：

（一）在木薯收穫時，不宜隨便放置，以免家畜或家禽取食，一定要曬乾或浸水煮熟後才可以應用。

（二）在晒場曝曬而沒有乾的木薯簽，應避免家畜或家禽進食。  
（三）就是晒乾後的乾木薯簽，雖然消失了大部份的氰酸，也應該分開數次，切不可一次餵得太多。  
（四）由於乾木薯簽很乾燥，澱粉質又多，吸收水份很高，因此用乾木薯簽飼養時，應立刻給予適量的飲水。（臺中縣豐原鎮圳寮里圳寮路四十號張燈雄）

## 我種瓜的方法

諸如南瓜、冬瓜、木瓜、茄子：各種的瓜類，茄類均容易謝花，果實容易枯黃掉落，這雖然與土壤和肥料也有關係，但是所留的種子如何，以後却會大受影響，茲願將我栽種的方法提供出來給大家參考：

（一）要留種的瓜、茄宜選擇果實較大而且早結實的，如此所留的種子，下一代能提早收成，比留後結果的種子要好得多。  
（二）像茄子、木瓜等的果實因過黃而掉落在地上的絕對不可拿來留做種子，假如播種，則將來長出來的勢必容易謝花落果。  
（三）南瓜、冬瓜等搭棚架，能使空氣流通，增進著果率，且可防止潮溼，減少枯黃腐爛，比起在地上任其生長的收成要高百分之五十以上。

（四）要勤加澆水施肥，果實才能長得大顆，否則便容易凋落，所結出來的果實又小又硬了。（苗栗縣三灣鄉三灣村一七六號黃仁德）