

# 箱信業農



## 桃核

山核桃用接木繁殖  
移植苗木根部需包土

【問】：(一)山核桃如何育苗？  
(二)育苗後的管理法如何？  
(三)移植適期和移植後的管理法如何？

埔里鎮本部溪中山路十六號戴牧原)

【答】：(一)美國山核桃宜用接木法繁殖，其砧木宜用共砧，即利用小形或中形之美國山核桃種子播種。種子採收後宜於當年播下，或砂藏至次年二、三月播種，如採收後未經砂藏，於一、二月間播種，則必須於播種前將種子浸水三十六至七十二小時。如目前無種子，亦可掘取樹根，用根播法繁殖。

播種苗之根極深，苗圃宜選擇水良好，表土較深厚者，畦幅二尺，株間五、六寸，每處播一粒。發芽後，在初夏可用鐵刀插入土中，將直根之先端切斷，促其發生側根，並注意肥培。發育旺盛者，夏秋即可供芽接用，或次春一、二月間供枝接用。芽接宜採用環狀芽或貼芽接，在七月間即可行之；枝接對較小之砧木用搭接或舌接，較大之砧木宜採用割接或腹接。

(二)接木後宜注意中耕除草，過乾旱時宜行灌水，苗稍大時宜設支柱，並注意肥培。

(三)移植在林眠期中，愈早愈好，可自十二至二月間行之，苗木掘起後，宜即用土包根部，以待包裝或至適宜地點假植，因其根最忌接觸空氣與日光，故如任其曝露，則栽植後死傷多而生長不旺，在栽植時如天氣乾

## 果 檬

市售紅皮檸檬  
多屬愛文海頓

【問】：(一)現市面有售一種紅色果皮檸檬，是否新品種？何名？  
(二)上述品種之檸檬，臺中地區是否適合種植？其苗木何處有售？或自行接芽即可？  
(三)種植後幾年可以收穫？經濟壽命多長？行株距須若干？(臺中太平鄉光隆村光興路六號趙子鏞)

【答】：(一)現市面所售紅皮檸檬，主要為美國種之愛文和海頓兩品種，係近五年來推廣之新品種。  
(二)中部海拔五百公尺以下地區強強可栽種，但不如嘉義以南地區適宜。鳳山熱帶園藝試驗所有苗木出售，每株售價十五元，自行接木繁殖亦可。  
(三)嫁接苗種植後第四年即開始結果，樹命長達五十年以上。行株距各採十公尺，不過可採密植以五公尺四方栽種十年，後再行間伐，對土地利用及經濟收入有所補益。(王兆全)

旱，宜充分灌水，如不行灌水，則必需在栽植前將根先行沾泥漿，以免枯死。(朱長志)

## 樹 梨

七種新梨主要特性

【問】：(一)梨新品種如新世紀、廿世紀、長十郎、菊水、巴黎、新興及晚三吉等，各適於何種地質和氣候？  
(二)各種梨之主要特性請分別介紹？  
(三)何梨為軟枝及硬枝結果？  
(四)以上七種品種要如何栽培，如何施肥？何處有苗木出售？(彰化縣社頭鄉龍井林水井巷三號蕭郡)

【答】：(一)所述七種梨，均適於臺灣山地海拔一千五百至二千四百公尺地區栽培，海拔較低之地區，冬季過暖，不能有正常之生育與結果。  
(二)各品種之特性列表說明如次：


(一)各品種之特性列表說明如次：

穗枯病 · 穗稻熱病 · 稻胡麻葉枯病  
最新殺菌劑——效果顯著

# 添米多

## テンハイド

農藥登記證1187號  
新殺菌  
水和劑



使用「添米多」四大優點

- ◆ 稻粒大，熟度差齊，有名稱其實之增收功效。
- ◆ 於出穗期所發生穗枯、胡麻病菌、穗稻熱病有顯著的效果。
- ◆ 殘效性長。
- ◆ 對人畜無藥害可安全使用。

農約登記證1112號

# 賜滅多乳劑

## スマイト

原裝進口

紅蜘蛛  
最新特效藥

- スマイト乳劑本年度新增加推廣之紅蜘蛛藥劑。中文名「賜滅多」具有下列五大優點：
- ①スマイト乳劑2000倍對各種紅蜘蛛具有速效性，倘且有一個月以上長久持效性。
  - ②對別種藥劑已具有抵抗性之紅蜘蛛亦能獲功效。
  - ③與波羅多液及其他一般農藥均可混用。
  - ④對人畜無害。
  - ⑤物價低廉，使用安全。



製造廠：兼商化學工業株式會社  
發賣元：兼商株式會社

總代理：文山企業行  
臺北市南京西路410號 電話：42203