

壓條法，一為在砧木上舉行嫁接，以後者繁殖之幼苗，其根系更能深入土層，將來發育可較良好，且抗旱抗風之能力亦較強，故以種植有砧木之嫁接苗較為理想。(張振宙)

秋後荔枝宜乾寒

肥害多先枯葉尖

【問】：(一)荔枝已種三年半，樹幹直徑約五公分，高三公尺許，樹冠周圍約有三公尺，但不開花結果，原因何在？據當地人說：白露荔枝如施肥和灌水，到春天一定不開花結果，這種說法是否可靠？

(二)大小樹同時施肥灌水，但發育較差之小樹反而開花甚多，結果不錯，是何原因？

(三)有一棵高二公尺，每週灌水一次，但仍葉黃枯萎，是否肥傷？或有其他原因？

(四)肥傷樹之根部是否會腐爛？或有什麼徵候可看出？

(五)懷特芒果開花多而結果極少，是何原因？

(六)在來種芒果已接上「懷特」品種，想再改接美國「愛文」芒果是否可以？會發生什麼不良結果？(高雄嶺上寶巷十八號張才照)

【答】：(一)荔枝發育十分正常，但不開花結果，其原因可能與管理不當有關。荔枝幼苗還沒有開花以前，必需經常注意施肥灌水，使繼續不斷充分發育。到開花年齡後，祇可在春夏季作合理施肥，秋後宜使其停止生長，漸漸進入休眠狀態，以便形成花芽。惟促使進入休眠狀態形成花芽的條件，有二：即寒冷與乾燥。秋後灌澆與施肥都可引起抽生新梢，而秋後抽生的新梢到翌春大多不能開花。

(二)小樹可能因生長不良，不受灌水施肥的影響，在秋後抽生新梢，所以倒能開花。理由與(一)同。

(三)葉黃的原因，大多與營養不良有關，引起營養不良的原因常與下列幾點有關：(1)

排水不良或積水。(2)過分乾燥。(3)缺乏氮肥。(4)枝幹部受嚴重損傷。肥害的初期現象是葉尖以至葉緣首先枯乾，繼而脫落。

(四)受肥害的根部在初期不是腐爛，而是萎凋。

(五)每一樣果花序中包括有兩種花：一為雄性花，一為完全花或兩性花。兩性花在花序中所佔的百分數愈高，結果常較多，反之結果便少。這種百分數的高低與品種有關。同一品種在不同年份的百分數也不盡相同。所問的懷特樣果開花多而結果少的原因，可能在此。

(六)可能無顯著影響，愛文種的產量最高，不妨再改接。(張振宙)

魚 養

大鱸小鱸分池養

池底填土約三尺

【問】：(一)養鱸魚池底須要多少土？多少水？

(二)要設那種飼料？

(三)要不要設置生蛋處所？如何設置？

(四)鱸魚大小要不要分開養？(臺東東河鄉東河村二一號楊全順)

【答】：(一)如利用磚池飼養，池底須填土三尺左右，水深約一尺即可。

(二)鱸魚嗜食動物性餌料，如蚯蚓、下什魚等等。

(三)目前為自然繁殖，似所需特別設置產卵處所。

(四)鱸魚有自相殘食習性，大小應分池飼養。(應德壽)

豬 養

母豬生後嘔吐惡寒

可注射垂體後葉素

【問】：(一)母豬分娩後發生嘔吐，惡寒之現象，是何原因？如何治療？

(二)體量三十五公斤之豬，患有肺炎氣喘及大腸炎血清治療，施以靜脈注射二十°C即當場死亡，剩餘的血清注射別的豬隻，則未

請用：

西德 K. D. Feddersen & Co.

榮譽出品 世界微毒殺蟲劑

現貨供應

加 巴 美
50% 可濕性粉劑
Carbamate
50% W.P

農藥登記證
農藥字第0398號

防治□水稻、柑桔、鳳梨、蔬菜等一切蟲害

經銷處：泰洋股份有限公司 臺北市重慶北路2段108號 電話44994
東益貿易股份有限公司 臺北市南京西路26號2樓 電話43802
總代理：惠農股份有限公司 臺北市長安東路2段16號 電話52093

