

矮化栽培

貯藏至一年後，則僅有二〇%可以發芽；貯至一年半後，則完全失去發芽力。

木瓜一年四季均有成熟果，所以一年四季均可播種，但在冬季播種時，由於溫度過低，有行保溫播種的必要。在夏季播種時，則由於溫度過高，有行遮陰播種的必要。

木瓜的播種方法有直播和床播二種。

但為管理周到，一般以床播為有利。苗床寬一公尺，高十五至二十公分，長則隨需要而定。一坪地的苗床，宜施入腐熟堆肥三十公升，氮素三十公分，磷酸十五公分，鉀六十公分，均勻拌入床土內，然後將苗床整好，以二十公分的行距播種，然後蓋上一公分厚的土，輕輕壓緊，再以稻草覆蓋。苗床上並宜設立三十公分高的支架，以備覆蓋竹簾式玻璃布等，俾利冬季保溫及夏季防高溫、豪雨。

發芽後，宜以十至十五公分株距施行疏苗，苗高達三十至五十公分時，則細心掘出，勿使土與根離開，慎重定植，然後灌以多量的水，使土與細根密接。以後乾燥時並需灌水以助其順利發育。

矮化栽培方法

定植後，發生本葉十枚上下時，施行摘心，將頂部摘去，如此可促進側枝發生及開花結果，並在矮小的樹上生產。

樹形矮化後，不但抵抗暴風之力增強，且在寒冷季節行保溫及防寒亦極便利，尤其在早春播種者，年內即可收穫完熟肥大的果實。

用本法栽培，可在短期內收成，所以自初期起，即有使生育順調的必要。因此，栽培地需要選擇陽光充足，排水良好的砂質壤土，並在夏季乾燥時，不能不有充分灌溉的設備，以備隨時做灌溉之用。用本法栽培時，早者經過五個月即可開花，而樹高不到一公尺即可結果。

一般木瓜，在栽培土壤良好時，栽種後一年乃至一年半，始可第一次收穫。結果最盛的時期，為最初的三年，以後收穫量則漸次減少，所以經過六年即宜更新。又一株木瓜的著果個數，雖依植株生育狀況難免有多少差異，但矮化的木瓜，每株以使結五至十果為宜；如此，一分地如栽植一千五百株，每株結五果，每果一公斤重時，一年可生產七千五百公斤之多。再者，為促進果實肥大，在達預定果數後再行摘心為可。木瓜的雌花，由於摘心的關係，有發生於尖端的傾向，所以以留存外芽，適宜施行疏花，並在留存果之上，留二至三枚之葉，試行摘心為可。

一般木瓜的栽植株數，在夏威夷，每十英尺見方，起初栽植二株，俟開花，能區別雌雄株時，再除去一株。在巴西，則一分地規定栽植九百株。但行矮化栽培時，多少密一點，一分地可栽植一千五百株。但栽植過密時，樹間日照受限制，通風亦不良，所以亦不宜過密。

其他施肥管理方法，概可參照一般栽培法行之。

農藥 日產

益農產 乳劑

農藥登記證第851號



益農產可殺死

蔬果·水稻·什糧等各種害蟲，最新藥劑
特點→低毒·速效·適要範圍最廣

中日合作成品		進口原裝貨	
伊必日必安	乳劑 (登記證1061)	必愛用	乳劑 (登記證192)
產	乳劑 (登記證1069)	益農產	乳劑 (登記證827)
必安	乳劑 (登記證786)	飛佛達	粉劑 (登記證155)
利	乳劑 (登記證780)	水銀	粉劑 (登記證244)
日產	乳劑 (登記證1068)	銅	水和劑 (登記證251)
日產	乳劑 (登記證782)	殺菌噴	水和劑 (登記證440)
日產	乳劑 (登記證778)	2-4-D	除草劑 (登記證633)
日產	乳劑 (登記證819)	大生精	乳劑 (登記證385)
日產	乳劑 (登記證851)	日星	乳劑
日星牌藥錄 (混合肥料) (肥料登記第77)			

日星實業股份有限公司
台灣日產化工股份有限公司
台北市南京西路五號之一 電話：59961-4