

(聰伯林) 範示培栽

花蓮地區 改良糊仔甘藷 栽培方法

— 林友平 —

花蓮地區改良糊仔甘藷栽培，比普通糊仔栽培時塊根收量可增加六成以上，諸蔓也可增加四成左右。本刊第十七卷十五期十六頁已將改良糊仔甘藷栽植前的二期水稻插秧方法介紹，下面再介紹以後的栽培步驟。

種植期 改良糊仔甘藷的種植時期，比普通糊仔提早二十至三十天，即水稻收穫前四十至五十天內種植。花蓮地區在九月中、下旬為宜。

作畦方法 在第二次除草後，將田間積水放乾，作成糊仔種植畦，畦高六十公分，寬十公分。不必插入土中。利用畦溝泥土，用手掘起壓在諸苗的第一節和第六節即可，不必全部蓋土，以免諸苗腐爛。

施肥 諸苗成活後十日內，施堆肥於畦上或畦溝，作為基肥。第二次施肥（追肥）應於水稻收穫後立即施用，條施於苗的兩側，每分地施肥量堆肥一千公斤，硫酸銨十五公斤，過磷酸鈣十五公斤，氯化鉀二十公斤。施肥後應即培土。

培土 水稻收穫後，應先用蜈蚣犁碎土，再用鋤頭培土作畦。

田間管理 第二期水稻黃熟初期，輕輕壓開

稻株，使諸苗充分接受陽光照射，以利幼苗生育。生育後期，田間應保持乾燥為宜。


收穫

糊仔甘藷的收穫時期，應視第一期水稻插秧遲早而定，以不影響第一期水稻插秧為原則。改良糊仔甘藷的生育，至第一期插秧時至少有五個月以上，所以可在插秧適期前收穫，不會影響第一期作水稻插秧工作。

收益比較

改良糊仔甘藷的生產成本，吉安示範圍增加七三六·七〇元（一三·七%），玉里示範圍增加八〇九·八〇元（一四·五%），且由於產量的提高，純收益仍較對照圍為高。例如吉安示範圍純收益一七、〇三五·五〇元，對照圍為九、五四二·四五元，也就是說示範圍的純收益比對照圍增加七、四九一·〇五元（七八·五%）

又如玉里示範圍純收益一八、七六一·八〇元，對照圍八五五·六〇元，示範圍的純收益比對照圍增加一〇、二〇五·二〇元（一、一九·二%）。



(聰伯林) 薯甘的收穫圍範示



公路上路坡草種 「帶生植」用試

為了綠化並保護本省山地公路，農復會森林組正在臺中中潭公路的「上坡」上利用「植生帶」種草。一般公路的「上坡」多沒有表土，種草不易成活。「植生帶」是用紙做成的繩狀物，裡面包有草種及肥料，在公路的上坡挖掘淺溝埋入，只要土中水份足夠，草種即迅速發芽，操作既簡便，成活率又好。（陳振威）