

# 農友經驗



## 如何栽培長枝竹

在臺灣種植香蕉最怕颱風與季節風，因為這種風災所造成的損失是無法估計的，如要防備這種災害，最好的方法莫過於在蕉園周圍設置防風林和豎立香蕉支柱，而最適於做香蕉防風林和支柱的，便是栽培長枝竹。因長枝竹抗風性強，成林甚快，既可鞏固土壤，保持水土，又可做為香蕉支柱，編造香蕉籠，更有美化環境，防止竊盜侵入的作用。

長枝竹的繁殖時期，一般說來，每年春季（即三月到四月間）是種竹的適期，本省各地均可種植，方法極為簡單，一般成活率亦甚高。長枝竹的繁殖方法有下列三種：

(一)分株法：①取苗：選擇一、二年生的新竹，連頭掘起，從基部上面第三或第四節間（約一公尺）鋸斷，加以移植，掘取搬運時要注意不傷節芽。②栽植：預先掘好植穴，深約四十五至五十公分，寬度越大越好，每穴種一苗，將堆肥和掘起的表土混合後覆土，分層踏實，植穴上面鋪蓋稻草，再薄薄蓋一層土，從竹苗上部的截口灌入清水，並將竹苗露出地上部份，用稻草包好，以防曝曬枯死。

(二)插種法：①取苗：選取發節後約一至二年的竹桿，自基部三分之二以下的部份，截成數段做為插種，每穗有兩個竹節，每穗可取七到十穗。

每五、六支捆為一束，放在水溝或池塘中，使稈穗的下端浸水，約兩星期後發芽，便可插種。②扦插：插種前先在插穗上節的下面穿孔，將清水灌入節內，然後將插穗斜插在深約四十五公分的植穴內，上節稍露地面，下節埋入土中，覆土踏實，以後要常在上端截口灌水。

(三)埋種法：①取苗：該法亦係以一、二、三年生的新竹截成段做為插穗（埋種法因竹桿近梢部份也可利用，故每穗可取更多的插穗），每二節或三節切做一穗，節上如有長出小枝，應留六公分長，在節的正中間部位穿孔灌入清水後塞住孔口。②栽植：插穗切好後應立即埋種，植溝深約二十公分，將插穗平放於植穴內，使小孔向上，節芽在左右兩側，再用細土填實覆土，厚約十公分，然後敷草澆水。

竹苗栽植後，應該視土質乾濕情形澆水，看雜草發生的情形除草；通常第一年除草二次，第二年三次，每年中耕一次，將竹株週圍鋤起，同時埋入堆肥、竹葉、乾枯雜草等有機質肥料，掉落的竹葉因含有豐富的矽酸，應好好的加以利用。

施用化學肥料以氮二、磷一、鉀一的比例混合：第一年每株一公斤，分在六月及九月兩次施用，第二年、第三年各兩公斤，第四年以後每年三公斤，分在三月、六月、九月三次施用，施肥時要在離竹株約三十公分的週圍掘一淺溝，放入肥料後覆土。

伐竹應等到第五年以後才能下手，每年擇伐一次，選四年以上老竹，

在冬季中耕時砍伐最好，伐竹時不可用鋸子切鋸，必須使用銳利的刀伐砍，這樣纔可使新筍繼續不斷的發生，使竹林生育更加旺盛。（竹南鎮港崑里七十六號蔡有仁）

## 塑膠帶縛茶香蕉

每年當颱風季節來到時，蕉友們又得為防風工作而忙了。往年我也像一般農友一樣，為縛茶香蕉到各地去搜購舊輪胎，而後又要花很多時間去裁剪它，再拿去蕉園使用。

去年，由於搜購不到舊輪胎，到街上買了些塑膠帶回來試用，結果非常理想。它的好處有下述幾點：①縛架方便牢固。②經濟又耐用，不易損壞且攜帶及保管容易。

各位蕉友們，當你們要縛茶香蕉時，不妨試用看看。（彰化縣埔心鄉油車村廿八號李瓊秋）

## 烟蒂絲驅蛔蟲

### 火烘可止痛癢

(一)養鳥的熱浪退去後，養雞的風氣傳遍了家家戶戶。我家養了二十隻「飼料雞」，每半個月過磅一次，第一次的成長率，個個相差無幾，第二次（一個月時）發現大的十五臺兩，小的不到半斤，顯著的差異，促成我的好奇，尤其是那幾隻只會吃而不長大，羽毛也不順的藍雞，經詢問同事說：「飼料雞，如給青菜葉做補助飼料，肚腸裏會有很多蛔蟲。」

因養麻雞虧本，我用了簡單方法

：每一週每隻灌給一湯匙的烟蒂絲（混合在飼料中），雞吃了之後，不但沒死，反把肚裏的蛔蟲驅出很多，以後的成長率就很平常了。

(二)削芋頭的外皮，並把芋頭切成小塊供料理，往往雙手會觸及芋汁而感到無比的痛癢，老人家說：用鹽擦一擦會好，但逾擦逾痛。有一次，又沾到了芋汁發癢，我就把雙手伸到爐火上（離火一尺許）稍為烘一下，說也奇怪，痛癢竟馬上停止。據說：削山芋（諸芋）、切辣椒也有類似情形發生，用同法亦能收效。（新竹縣關西鎮西安里老街五號劉玉梅）



雲林縣西螺鎮東興里七十一號林齊農友所種的軟枝密粉桃（摩欖橙）