

農葉信箱



葡萄

葡萄在冬季修剪
套袋前可先施藥

【問】：(一)請問宜蘭地區壯園鄉一帶，適合何種葡萄栽培？其臺木各以何種為優？何種土壤最適栽培？栽植之株行距，三要素之配合量及施肥期應如何？

(二)棚架之架設高度及水泥柱間距如何？(三)棚架外圍線用二條八號鐵絲，合併負荷量足否？水泥柱之製造規格如何？內部應用幾號鐵線製？

(四)棚架鐵絲塗柏油是否會影響葡萄之生育？

(五)葡萄成熟前用紙袋套上，內部放何種藥物防治病蟲害較有效？

(六)宜蘭地區葡萄發育較早，其修剪程度如何？何時實施？修剪後(休眠期)應施何種肥料？每分地施肥量及施肥期如何？(臺中縣政府林務課陳春雄)

【答】：(一)未經詳細調查無法判定適合品種，最好自己訪問當地有關機構或有經驗農民。一般栽培地之土質，只要排水良好，含有砂礫的壤土或黏質壤土即可。據筆者瞭解，以種植早生或中生品種為宜(如 Camiphell's early Niagara, Kyoho, Neomuscate 等)。

(二)苗木中之四二〇A、三三〇六及八B等，一般生育良好。行株距離，因品種而不同，一般情形，平地六公尺平方，斜坡地可採三×六公尺為宜。

三要素之配合：一般應視實際生育情形而定，據士林園藝分所三年生，四十株配合量為：堆肥一千公斤，硫酸銨十公斤，過磷酸石灰二十公斤，硫酸鉀九公斤。施肥期：基肥一——二月間施用，追肥第一次在疏果期前數天施用，第二次在果實着色前施用，酌用石灰，第三次在果實採收後施用。

(三)棚架之高度為二公尺，水泥柱距離四×六公尺為宜。

(四)水泥柱之「角柱」長十一臺尺，寬五臺尺×四臺寸半為標準，「平柱」長九臺尺，寬四臺寸×三臺寸半，「中柱」長七臺尺，寬二臺寸平方，內部鐵絲，「角柱」三分徑，「平柱」二分徑，「中柱」八番鐵線。

(五)塗柏油無何影響，塗時應於新建時或休眠時為宜。

(六)套袋之前用「五——五式」波爾多液或「大生七八」八百倍撒佈一次，然後套袋，袋內不放任何藥劑，如再有蟲害，可撒「賽文」一千倍液一次即可。

(七)修剪應在落葉後，十二月——二月間實施，以中長梢(四——七芽)法修剪之，施肥參閱第一項。(葉鴻蘭)

龍眼

龍眼採果宜用剪子
嫁接苗結果較整齊

【問】：(一)龍眼樹八年生，植於山坡地，斜度約四、五十度，南向背風，下有溪流，土質為礫質壤土。

(二)今年初次結果(以往只開花不結果)，結果株約二分之一，有的果實疊疊，有的却了數顆，為求均勻，要怎樣處理？

(三)據說龍眼是宿年作物，有大小年之分，確實否？要如何處理使其年年都能生產？

(四)有無方法可使其提早或延遲成熟？

(五)要如何施肥？肥料以何成分為主？

(六)採收時用手折？或用剪枝刀剪？那一種正確？折或剪的位置應距果實柄柄的何處為宜？

品質最佳 · 敬請愛用

各種病蟲害之防治

紅克民福加蟲掃淨新
蓋豐熱斯倍蟲蟲蟲
紅松寶靈米敵寧寶銀
蟲紅松寶靈米敵寧寶銀

民豐化工廠股份有限公司

公司：台中縣大肚鄉中和村中山路10之6號3樓 電話：烏日局106·107號
工廠：台中縣大里鄉內新村內新路72之6號 電話：8145號