

莢，以免折斷植株。乾燥時可予以灌溉，如能配合施肥時灌溉，可使肥料溶解以供植株吸收。

適時採收·價值最高

莢豌豆如適時播種，播種後六十至七十五天即可開始採收。北部地區因豌豆栽培期間氣候寒冷多雨，通常較中部延長五至十天成熟。莢豌豆亦因其利用目的不同，而按各項標準適時採收。莢豌豆採收適期，應在莢有適當長度，但莢面平滑，豆仁尚未膨大以前採收為宜。如以目前冷凍莢豌豆標準，採收時莢長最好在二至二吋之間，豆莢扁長形而不彎曲，莢色翠綠，每公斤不超過六百莢，也不少於五百莢，如此就可合乎冷凍豌豆規格標準了。以往一般農友栽培「臺中九號」莢豌豆，都因過遲採收，以致莢豆變為粗硬，降低商品價值，實為可惜。



「花白來在」豆豌豆：二圖

。但如果為了留種，那就得在莢殼變黃後才可收穫。


防治 病蟲 保證 收成

病：豌豆莢基部接莖基部近地面部份發生絹毛狀菌絲，逐漸包圍莖基部，後生灰白色菌核，以致莖部枯萎。防治方法，在發芽後幼株時期，用水銀波爾多液每隔七日噴射莖基部接近地面部份二至三次。播種時避免用發生過水稻紋枯病的稻草製造的堆肥覆土。

銹病：在一、二月時為害嚴重，病斑發生在葉部，隆起破裂，散出淡黃色粉狀物，蔓延迅速，被害嚴重。防治方法，在栽培期間每隔七日噴射「錳乃浦」四百倍液防治。

豌豆白粉病：為害莖葉和莢部，初在豌豆莖部發生白粉狀小斑後，逐漸蔓延，嚴重時全株似撒佈一層白粉，不久病斑變灰色，並發生黑粒點。本病多在近成熟時發生，病株變弱以致枯死。防治方法：栽培田應通風良好，適時播種並充分施用磷鉀肥，強健植株，發病初期可用「可利生」一千倍防治。

蟲害：夜盜蟲可用二十五倍DDT乳劑五百倍液防治。葉潛蟲、豆潛蠅和蚜蟲等，可用「馬拉松」八百至一千倍液防治。



較比莢豆豌豆莢硬和莢軟：三圖

家畜

保險

第十二次

有獎

徵答

揭曉

臺灣省家畜保險輔導委員會舉辦家畜保險第十二次有獎徵答，應徵農友非常踴躍，全答對者計有二百一十名，經省農會於五十六年九月廿二日在嘉義市農會議事室召開的五十六年度第三次省縣市(局)農會家畜保險工作會報，公推合作金庫周義通先生和土地銀行林金和先生為監獎人，並由會議主席省農會家畜保險部主任吳錦主持公開抽籤決定獎次，其結果如下：

一等獎：吳再丁(高雄縣燕巢鄉)得獎價值三百元之電鍋一個。

二等獎：黃響(高雄縣內門鄉)得獎價值二百元之日光燈一座。

三等獎：周有財(臺北縣三峽鎮)得獎價值一百元之桌燈一座。

等外獎：王李秋(新竹縣竹東鎮)，黃耀祖(新竹縣竹東鎮)，彭勝芳(新竹縣竹東鎮)，洪姜十妹(新竹縣新豐鄉)，胡坤和(苗栗縣頭屋鄉)，梁新隆(苗栗縣頭屋鄉)，李莊水金(高雄縣鳳山鎮)，林大茂(高雄縣鳳山鎮)，顏明(高雄縣橋頭鄉)，劉金寶(高雄縣橋頭鄉)，楊再復(高雄縣燕巢鄉)，宋清榮(高雄縣燕巢鄉)，陳六(高雄縣路竹鄉)，黃榮客金(高雄縣永安鄉)，洪治和(高雄縣永安鄉)，許陳于(高雄縣永安鄉)，鄧金鷄(高雄縣永安鄉)，林登福(高雄縣內門鄉)，卓長安(高雄縣內門鄉)，游綠(高雄縣內門鄉)。各得價值二十元之汗衫一領。

土期答案：
一、耳標。二、投保農會。三、臺灣省家畜保險輔導委員會。四、無效。

