

箱信葉農



龍眼

龍眼採果前施肥
可促進來年結果

【問】：(一)龍眼果實不甜，且大小懸殊很多，如何改良？

(二)龍眼的甜分高，水分少，所製成龍眼乾量是不是較多？

(三)木瓜過高採果困難，要如何處理？是否可留用基部的芽而將主幹砍除？

(四)楊桃發育好枝葉茂盛，但不結果，應如何處理？

(五)為防止枇杷和柚子徒長，要行整枝，其時間各在何時？

(六)現在開花的枇杷，是否可留果？

(七)波羅蜜在臺灣價值銷路如何？是否可多種？

(八)在中部何地有賣愛文純種檸檬果苗？(臺中縣霧峰鄉坑口村仁德巷四號莊湧沐)

【答】：(一)龍眼果實過分成熟時，其甜味日漸減退，尤以大果形品種特別顯著，但與葉片多少無關。果實大小懸殊，與品種有關。可高接優良品種改良。在嘉義選出的一「楊桃葉」、「昭安寮」和「綴繡」等品種果形大而整齊，食味甜，目前在臺南和高雄兩縣高接很多，很受果農歡迎。

(二)是比較高。

(三)木瓜在合理的栽培情形下，祇採收三年果實，便伐除更新，如此可避免植株過高，且可繼續維持正常產量。

(四)龍眼在秋季產生的新梢，經過冬季休

眠，都可開花結果，如結果過多，延遲抽梢時期，而在春後抽梢，則此種枝條雖生長旺盛，但不夠成熟，不能形成花芽，便不能開花結果。如在果實採收前予以充分施肥，促使果實採收後迅速抽新梢，應可糾正其不結果現象。

(五)果樹修剪整枝最適當時期，是在果實採收後。為避免徒長，不可施用氮肥太多。枇杷在花芽形成前，如施用氮肥太多，將促使產生新梢而減少開花。

(六)枇杷在高溫多濕時期所開的花，常因植株生長過于旺盛，大多不能結果而脫落。正當的花期約在十月。目前開的花雖少結果，但為節省人工，可不加處理。

(七)波羅蜜在臺灣沒有可靠的銷路，不可多種。

(八)愛文芒果苗，現在彰化縣永靖鄉五福村一帶苗圃，經銷者甚多，可採購。(張振宙)

葡萄

葡萄是否接木
須看需要決定

【問】：(一)我用酸葡萄做砧木，不知其名稱，今寄上樣本，請代為檢查，指示可接何品種？

(二)接砧木和不接砧木兩種比較，將來性及產量如何？(楊茂森)

【答】：(一)臺灣所稱酸葡萄，並非有固定之品種，凡酸味濃厚無經濟價值者，均稱為酸葡萄。

(二)葡萄容易生根，故一般用插木繁殖即可。

(三)葡萄接木之目的，主要為減輕根瘤蟲之為害，臺灣至今尚未發見有根瘤蟲，故無行接木之必要。

(四)葡萄有專為某種目的而行接木，如在乾燥之地，可用四二〇A為砧木。在低濕之地，可用一六一六號。樹太旺時，可用三三〇九號等接木。

(五)接木苗不一定比插木苗產量多及品質好。(謝克終)

民豐牌

民豐牌農藥

品質最佳 · 敬請愛用

各種病蟲害之防治

紅民福加蟲掃淨
克民福加蟲掃淨
豐熱斯倍
蓋松寶靈米敵寧寶
紅蟲

民豐化工廠股份有限公司

公司：台中縣大肚鄉中和村中山路10之6號3樓 電話：烏日局106·107號
工廠：台中縣大里鄉內新村內新路72之6號 電話：8145號