

荔枝

荔枝乾加工略同龍眼
惟殺青乾燥需時較長

【問】：請問荔枝乾之製作，可否比照龍眼乾製法？本省此兩項加工業，大多集中於何地？（臺中太平鄉光隆村光新路六號趙子成）

【答】：（一）製造荔枝乾的原料，以烏葉種與粗味種較佳，荔枝乾燥方法大致和龍眼乾相似，惟其殺青（Blanching）與乾燥時間需稍長。茲簡述製法如下：將去殼後的荔枝果肉先行蒸氣殺青十五分鐘，加砂糖十五—二十%（係將砂糖溶解於水後加入），在糖液中浸漬約一、二小時，後將果肉撈出平鋪於乾燥木盤或竹盤上，送入廂形乾燥機（可參看本刊第十七卷第三期第十一頁附圖），於華氏一百五十至一百六十度溫度，乾燥十四—十五小時，放冷後裝入鍍有保護漆層的鋼皮罐，或裝入玻璃瓶蓋緊蓋即成。如果短時間食用者，裝入塑膠袋亦可。至於荔枝全果（不除外殼），雖經長時間（約四十餘小時）的熱風乾燥，但因果肉組織的水分不易全部蒸發，因此乾製品含水量多，經貯藏一個月後就會敗壞，不堪食用，故以剝除外殼使用果肉乾燥為妥。

（二）關於荔枝及龍眼乾燥加工，為本省中南部山地一帶農民的一種副業，過去彰化縣之「裕園」、「新益」等食品脫水工廠，亦有少量製造，但僅供內銷。（陳景福）

蔬菜

水稻糊仔番茄

收前七天移栽

【問】：（一）本期水稻糊仔番茄何時播種？又水稻收割前幾天移栽最適宜？

（二）現在推廣的優良品種，大粒果與小粒果各有何種？何處有售種子？

（三）糊仔番茄用何種肥料？每分地大約用多少？（嘉義縣番鄉松竹村一八九號林國清）

【答】：（一）栽培糊仔番茄，宜在水稻收穫前二十五至三十天播種育苗。並於水稻收

穫前七天移栽於稻田，或待水稻收穫後立刻移栽。

（二）現在優良品種有：

（1）大果型：馬娜里、馬娜露西、農友雜交一號、鳳山雜交一號等。

（2）小果型：員林種、羅馬、農友雜交四號、鳳山雜交十七號等。種子可向鳳山鎮第二市場內農友雜貨店，或就近可達種苗商洽詢。

（三）糊仔番茄每分地應施堆肥二千公升（基肥），硫酸銨一百公升（三分之一做基肥，三分之二做追肥分次施用），過磷酸鈣八十公升（三分之一做基肥），氯化鉀四十公升（三分之一做基肥）。（邱阿昌）

冬筍是江南竹所生

宜種一千公尺山地

【問】：（一）冬筍是何種之竹所生？其與綠竹比較起來，有何優劣處？經濟栽培何種較有利？

（二）冬筍竹苗何處有售？（屏東縣萬巒鄉疏黃村光復路三十七號郭維藩）

【答】：冬筍是江南竹（亦名孟宗竹，閩南語為茅茹竹）在冬冬所產之筍，與普通綠竹筍比較品質都很柔嫩，不相上下。但綠竹中有一變種叫「烏腳綠竹」，筍質特優。如欲經濟栽培，產冬筍之江南竹，較適合於海拔一千公尺以上之山地，綠竹較適宜於平地栽培，市場售價以冬筍較貴。

（三）江南竹在南投竹山附近栽培甚為普遍。欲購冬筍竹苗，可到該地農家洽詢（張國良）

花卉

晚香玉可在新竹栽種

玫瑰花每月追肥一次

【問】：月來香又名「晚香玉」，在新竹栽植未知是否適合？因何抽苔開花很慢？有何促進開花方法？

（二）唐菖蒲種後發芽參差不齊，以致發育

請用：

西德 K. D. Feddersen & Co.

榮譽出品 世界微毒殺蟲劑

現貨供應



農藥登記證
農藥字第0398號

防治□水稻、柑桔、鳳梨、蔬菜等一切蟲害

經銷處：泰洋股份有限公司 臺北市重慶北路2段108號 電話44994
東益貿易股份有限公司 臺北市南京西路26號2樓 電話43802
總代理：惠農股份有限公司 臺北市長安東路2段16號 電話52093

