

開花相差甚大，應如何處理，才能使發芽開花時期整齊，又葉尖常見焦黃是何緣故？應如何補救？又曾發現，有球根與莖交界處呈黑斑，而腐爛發霉以致折倒，是何病？應如何處理？

〔答〕：玫瑰花以砂質壤土栽培，而施以堆肥和糞肥，但經四個月來却無多大增長，除部份正發育高及一公尺左右外，大多甚為瘦弱，矮小，應如何促進生長發育？（新竹市南門里中華路三十七號林慶雄）

〔答〕：（一）「晚香玉」在新竹可以栽培，在風力強大地方應有防風設備，以實際情形栽植防風，綠籬或草袋（豎立）。欲使順利開花，應選擇土層深厚，富含腐殖質之壤土栽植，栽植前多施腐熟肥或堆肥，並行深耕。定植球根時在穴底再施腐熟肥一把，上面蓋土五公分，後再將球根植入。生育期間施硫酸銨與豆餅水各一次（或施用水肥二次）。並時常注意澆水即可。為促進開花及使開花整齊，除依照上述栽培方法外，栽植前將球根置於冷藏庫中，在溫度攝氏十度下冷藏一個月，再行栽植即可。

〔答〕：唐菖蒲為使其發育及開花整齊，可在休眠期將球根在攝氏五度下冷藏二個月，再行栽植。

葉尖焦黃，於施用基肥時加入草木灰若干，或在發芽時，施用氯化鉀一次，並注意澆水，以資補救。

葉與球莖交界處腐爛，係頸腐病，其預防法，可在定植前將球莖放於一千倍昇汞液中，浸一小時。

〔答〕：玫瑰花喜較冷涼和乾燥氣候，北部雖稍冷涼，但時常下雨，中部氣候較為乾燥，一般情形在中部栽培玫瑰成績較為良好。施用堆肥應為腐熟者，糞肥亦須經過發酵或腐熟後根部始能吸收。栽植玫瑰除施用腐熟堆肥或糞肥作為基肥外，生育期間（即開花前）尚須施用硫酸銨或水肥，作為追肥，可每月施用一次，量不可過多（硫酸銨每株一握為度），另外注意鬆土（中耕）及澆水，當可繁茂。（呂淑濤）

蘭花栽培參考書

中華書局有代售

〔問〕：據實刊刊載，董新堂先生著有「養蘭學」一書，應如何洽購手續，價款若干？請賜告為盼。（新店碧山村三五號鄧江浦）

〔答〕：最近本刊刊載，董新堂先生來函，詢問董新堂先生編著之「養蘭學」一書，茲經探詢結果一並奉告如次：

（一）「最新蘭花培育法」（再版）每冊定價新幣五十元。

（二）「蘭花繁殖育種法」（再版）每冊定價新幣六十元。

（三）「養蘭法各論」（初版）每冊定價新幣精裝一百元，平裝八十元。

（四）「養蘭學」係以上三書精裝一冊，每冊定價新幣二百元。

（五）以上各書，臺北市重慶南路中華書局均有代售。如向董君選購，一律照定價八折優待（包括郵費在內），請向當地郵局劃撥郵儲（二四二二）號董君帳戶，即可寄上。（張曾剛）

洋菇

洋菇堆肥可施鳥肥
推積發酵必須完全

〔問〕：（一）洋菇推積堆積時，可施放鳥肥嗎？

（二）每堆可放鳥肥幾斤？施法如何？

（三）施鳥肥對洋菇產量影響如何？是否勝過硫酸和尿素？

（四）假如施放鳥肥有利，是否可以免施硫酸、尿素等？有何注意事項？（彰化埔鹽鄉大有村員鹿路一二二號陳財桂）

〔答〕：（一）稻草推積發酵時，可以施用氮化鈣（鳥肥）。

（二）稻草每一百公斤，可以施用氮化鈣一·五—二公斤，可在推積同時撒入堆積的草堆內。

（三）如果施用鳥肥發酵良好時，洋菇的產量很高，反之產量很低。

（四）目前鳥肥的施用，是和硫酸或尿素共同施用，但單獨施用者，在國外是有記載。


東海牌動力噴霧、灌水兩用機

日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高


附三菱牌馬達
一馬力及附屬品，
亦可調換汽油引擎
亦使用。

重量：17kg
噴霧量：29公升
灌水：53公升



優點：

- ①24小時繼續使用不損機件。
- ②抽水可達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
- ③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
- ④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。



樣品、剪定、接木刀、第開引、生花針

閩恒老牌

天下一品

赤白ビニール卷

現貨供應

總經理 新高貿易股份有限公司

臺北市峨眉街68號
電話：34190號

各項優良新品

收多·大快·腐耐·病耐
培栽易容·良優質品

藤田交配	綠寶甘藍
長岡交配	早秋甘藍
サヲダ白菜	濃紅鮮艷
新黑田五寸人參	大五寸人參

售分有均行子種大各省全
種試顧惠購向近就請敬

應供子種良優項各有備他其

街門西義嘉
3479 話電

行商和瑞周理代總灣臺