

果實變為三角形、皮厚，影響品質至大。
要使無子西瓜結果良好，並提高其品質，實行人工授粉時，每十公畝地應栽植普通有子西瓜（鳳山一號用新富光，鳳山三號用蜜寶最好）約二十五株作為花粉採集之用。到了留果期，每天早晨取紙箱或飯盒採集花粉品種的雄花，把其花粉輕輕擦到無子西瓜的雌花柱頭上即可。

成熟期少灌水

瓜果發育期要有充足的水分和肥分才能促進果

實的肥大，但果實發育至固定大小時，果實即將進入成熟階段，此時灌水量應減少，並停止施肥，以免引起果實內部果肉崩裂，果皮浮長，果形凹凸不正，味淡不甜，影響果實的品質和貯藏力。

嚴防病害發生

無子西瓜最容易患蔓割病和萎枯病，病害嚴重時，果實未到成熟時植株即枯死，所產果實味淡不甜，降低商品價值。栽培時應選用無病種子，不要連作，合理施肥，並按期噴射農藥。

九分成熟時採收

無子西瓜的果實，在八分成熟時尚未達到最高甜度，且果皮較厚，肉色也較淡，品質不佳。九分熟時，品質最好，且不影响果實的貯藏力。十分熟時，則甜度減低，果肉變軟，風味不佳，且不耐貯藏。普通在三月上旬留果的，到開花後四十五天左右採收；三月中旬至下旬留果的，到開花後約四十五天採收；四月間留果的，則在開花後三十五天左右採收最為適宜。



正文 范農菜南越

越南

菜農

收入

豐裕

• 曦崇劉 •

越南一般農民的生活是艱苦的，但是菜農們的收入却很豐裕。作在大勒的范文正農友，就是很好的例子。
大勒位於越南北部，地勢高燥，氣候冷涼，是越南蔬菜重要產地之一，可是那裡的蔬菜栽培，在品種和技術方面，却有許多需要改良的地方。近年來，我國駐越南農技團派遣多位園藝專家，在那裡從事蔬菜栽培改良的試驗和推廣，使得當地菜農們增加收益不少。

就以甘藍來說，以往菜農們都用扦插法栽培，每作需時六個月以上，而且產量又不高。但自從我農技團專家林勝吉到那裡，引種「坂田甘藍」，改用育苗移植方法栽培後，每作所需時間由六個月縮短為七十五天，而且產量比本地種高出五成，菜農



我駐越農技團駐大勒工作隊隊長劉德茂說明甘藍扦插栽培法在大勒地區已漸受淘汰



我駐越農技團園藝專家林勝吉和他引種成功的「坂田」甘藍

們的收入激增，舊式的扦插栽培法也逐漸受淘汰。
范文正農友只有四分地，因改用新法栽培新品種甘藍，每年收成從三萬六千公斤增至十一萬二千公斤，每公斤可售越幣十八元，共可售得越幣二百萬元，約合新臺幣五十萬元。范農友只是眾多受益菜農之一，事實上越南的菜農們目前都很富裕，紛紛蓋起洋樓。