



### 豬病

#### 豬玩食泥土可防貧血 肝硬化多由肝炎引起

【問】：(一)我家養四頭三品種豬(三十臺斤)。近幾天喘咳又便秘，其中有一隻會惡寒戰慄，結膜鮮紅，經獸醫施打過五次並未見好轉(奇怪的是在施打時站立不穩，後來倒在地，好像死去一樣，經四、五小時才恢復，獸醫說是打「四環素」。「新安那加」、「氣微素」不會有此副作用。請問這是何病，應施打什麼藥？

【答】：(一)鄰居有隻在來種仔豬(三十五臺斤)，看來精神滿好，眼睛也沒有分泌物。體溫四十一度，尿淡紅色，便秘並附有黃白色。粘液帶惡臭，經過三位獸醫診治糞便並未見好轉，請問這是何病？要怎樣治療？又聽說這種秘結的情形下，如果尿液是潔白色(像開水)，怎樣治療皆無效，大都是屬瘧瘧，引蟲病，這會事實嗎？

【問】：(一)有些仔豬看起來是喘咳，但死亡一經解剖結果是肺部硬化(並不是在肺部問題)，又有些仔豬，一天死去，二頭，症狀是四肢倒地，不能站立，約經三、四小時即告死亡，請問這是何病？用何藥治療？

【答】：(一)小豬病發喘息有便秘，(如果您的仔豬已打過完化猪瘧疫苗，則無瘧瘧危險)，如果是肺腸炎，照理說，獸醫所打

的「四環素」「氣微素」「安那加」等應該有效，但打了五次仍未見效，可能有其他疾病，是否瘧瘧？弓蟲病？再請高明獸醫注意詳細診察為宜。弓蟲病應使用弓蟲靈或長效磺胺劑。  
打針後倒在地如死去一樣，經若干時間回復一事，可疑注射量過多，「四環素」「氣微素」等很少有副作用發生。  
【僅以便秘、高熱，而無其他病狀，很難診斷為何病，可疑細菌性腸炎，或瘧瘧或弓蟲病等。如前項請獸醫詳細診察較妥。  
【肝硬化，多為肝炎引起，死前可以看出黃疸症狀，即結膜及全身皮膚略呈黃色，有時可能有一點喘息(呼吸稍快)。  
仔豬一天死去一、二頭，四脚倒地不能站立等狀，為豬快要死時所有現象。對仔豬羣突然死亡，尤其多死去發育良好者則應注意(解剖即可發現病因)。水腫病可用水腫靈治療。仔豬貧血可使其玩食泥土預防及治療，仔豬出生三天後，放泥土於豬欄內讓其玩食。鐵質注射劑亦有同樣效果，但用泥土經濟實惠。

【問】：(一)母豬第一次用人工授精產下小豬七隻，第二次用公豬配種，經過二十天並無受胎，再經三、四次公豬配種仍然不受胎，未知是公豬不好，或母豬不好？  
【答】：(一)有人說第一次用人工授精的母豬，以後必須皆用人工授精，如改用公豬，則不能受胎，是否確實？(臺東縣大武壠大武街一七九號呂天德)

【問】：(一)母豬生產後，連續三次以公豬配種，均未受胎，可能因該母豬生產後受細菌等感染，引起子宮炎，致配種不受胎。此項產後感染在農村有所聞，如在初期能用抗生素、磺胺藥品，及時治療，並實施子宮洗滌，則能治好。

【問】：(一)母豬生產後，連續三次以公豬配種，均未受胎，可能因該母豬生產後受細菌等感染，引起子宮炎，致配種不受胎。此項產後感染在農村有所聞，如在初期能用抗生素、磺胺藥品，及時治療，並實施子宮洗滌，則能治好。

【問】：(一)草魚放飼以什麼季節最適宜，其他需注意要件如何？  
【答】：(一)草魚會發生那些病害，如何防治？  
【問】：(一)草魚放飼以什麼季節最適宜，其他需注意要件如何？  
【答】：(一)草魚放飼以什麼季節最適宜，其他需注意要件如何？

【問】：(一)草魚放飼以什麼季節最適宜，其他需注意要件如何？  
【答】：(一)草魚放飼以什麼季節最適宜，其他需注意要件如何？

【問】：(一)中國水產月刊何處可訂購？  
【答】：(一)中國水產月刊何處可訂購？

【問】：(一)中國水產月刊何處可訂購？  
【答】：(一)中國水產月刊何處可訂購？

農友們！種植結球白菜、甘藍等季節已屆，請向信用可靠，專營進出口各國優良種子的臺灣農產公司選購品質優良，外銷、內銷最佳之品質必為致富之要道。

一代交配黑葉成功白菜。一代交配濱光白菜  
一代交配千代田結球白菜。一代交配綠寶結球白菜  
ダイヤ60日結球白菜。一代交配勝光結球白菜  
一代交配早生ナツタカネ結球白菜  
一代交配金星結球白菜  
日本全國原種品評會入賞  
全天候可以栽培最不易腐爛  
**US ヒット甘藍**  
又名(奇美60日甘藍、奇特週年甘藍)  
保證比其他甘藍品種優良 每臺兩110元  
正紅心、豐滿、鮮麗、整一、品質最好、價格最高

**八江農藝 新黑田五寸人參**  
藥譽產品 市面類似品甚多請認明 八江「ヤエタネ」商標，以免被騙，全省有名種子店均售。其他美國產結球萵苣，洋芹菜，外銷用厚肉大甜莖等各貨全部入貨，價格表函索即寄。

臺灣代理 臺灣農產企業股份有限公司  
直賣部 臺灣農業資材股份有限公司  
郵政劃撥儲金一二七九九  
臺北市迪化街一段86號 電話44253・42365

里鄉石牌村富北九號張瑞源)
【答】：(一)中國水產月刊現已發行一七八期，可向臺北市開封街一段三四巷六號中國水產協會訂購。

(二)鯉苗須向經銷商訂購，臺北縣士林鎮倫等里楊石城，及同縣觀音山下獅子頭林海子，均為鯉苗商，價格視體型大小而有不同，目前不詳。

(三)鯉魚飼養法，非三言兩語說得了，主要的如池水深三、四尺，水量充沛，以免水質惡變，影響泛池，並有防逃設備，池底有軟泥尺許，大小魚分池放養，每日按時在投餌場給餌(餌料置於給餌籃內)，給餌應視當時鯉魚索食情形酌予增減，不可使用殘餘餌料，注意排水時，尤其在雨天，要注意逃逸。飼料一般用下什魚，近來亦有以專作養鯉用的人工混合飼料。

(四)鯉魚現在尚未到達人工繁殖階段。(五)目前有關鯉魚養殖資料不多，但鯉魚習性，晝伏夜出，嗜食動物性飼料，善逃亡，會自相殘食，故宜大小分養，並加防逃設備。(應德壽)

腰 腰果不適海邊種植

三年結果約十一公斤

【問】：(一)栽培腰果是否有經濟價值？每株結果最多與最少有幾磅？

(二)第三年開花結果，普通每株有幾磅？(三)腰果是否怕鹽分？如果在海邊栽植，受海風、海霧吹擊，是否影響生長？(四)銨磷鉀施肥比例如何？每株每年應施多少？

(五)四月開花，在六月結果，是否可靠？腰果是否不怕颱風？

(六)腰果能在乾燥與瘠薄地生產，如果在肥沃地種植是否更佳？(新竹市東南街四七之五號沈萬定)

【答】：(一)如能打開外銷市場，及將來在工業發展上有經濟價值。普通六、七年生約可收穫果十公斤，介壽果五十公斤，最少不一定。

(二)第三年開花結果，其結果量常因氣候

及其他外界因子影響，故不能一定。普通可收穫果三至五公斤，介壽果五、六公斤。

(三)腰果怕鹽怕風，不宜海邊種植。

(四)銨磷鉀三要素比率為一比二比三，結果年齡在三至六年生，每株每年施混合肥料一、五至二公斤。七至九年生施二、五至三公斤。

(五)因受氣候影響，開花期遲早不一，腰果怕風，開花期遇颶風最為不利。

(六)腰果栽在肥沃土壤，當然生長更佳。(王兆全)

棗 棗子收穫後施有機肥

開花結果期施肥

【問】：(一)棗子開花後不結果，而整朵花變黑(如樣本)，是何原因？如何防治？(二)一樹中只有一棵不結果，其餘都能結果。

(三)棗子正在開花，有一部份已結果，近幾天發現有毛蟲，可不可以噴農藥？如可以，應噴何種農藥？

(四)現一部份尚未結果，如要施肥可不可以？如不可以，則應於何時施用？(佳里鎮佳興國枝李忠立)

【答】：(一)印度棗初年開花，大多不能結果，主要原因為幼樹的花，發育多不正常，不能達成受粉作用，因此而脫落，這是正常現象，不必防治。另一原因與品種有關。凡低產量的品種，具有不能受粉的花數較多，所以落花落果的現象特別嚴重。

(二)開花期間最好不要噴射防蟲藥劑，如有必要時，最好噴佈馬拉松，因為馬拉松的殺蟲效力很好，而且毒性較低，影響較少。來信所說的毛蟲，可能是一種毒蛾的幼蟲，馬拉松非常有效。

(三)印度棗需在果實收穫後，施用一次有機肥料。如豬糞尿或雞糞等，促使產生新枝，並能在九、十月間開花結果。又在開花結果期間，施用化學肥料一次，促進果實發育，增加產量。肥料配合式可用八：八：十式。(張振甫)

東海牌動力噴霧、灌水兩用機


日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高

①附三馬力及馬力

②威力品

重量：17kg
噴霧每分
分灌水每分
53公升



優點：

- ①24小時繼續使用不損機件。
②抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。



岡恒老牌

天下一品

赤白ビニール卷

現貨供應

總經銷 新高貿易股份有限公司 臺北市峨眉街88號 電話：34190號

正光化工股份有限公司 誠徵外務員啟事

- 一、高農畢業或有農藥外務經驗者。
二、役畢體健，年在30歲以下，對農藥外務工作有興趣者。
三、寄相片家庭概況表，履歷表寫明身高體重及希望待遇寄臺北市松江路61號。

### 洋 菇

洋菇床底墊布  
可用PVC布

【問】：(一)百塑稀膠布(PVC)與布面出售之PVC塑膠布，有何不同？此布是否可用做洋菇床內襯？

【答】：(一)洋菇栽培床底內襯的塑膠布，是否必須打洞，如果不打洞，與外國淺箱式栽培有何異同？(二)雲林縣大埤鄉嘉興村八四號劉三慶)

【答】：(一)A、B是“Polyethylene”的縮寫，PVC是“Poly vinyl chloride”的縮寫，其化學組成當然有所不同，現在用最易了解的例子說明：如果你使用苦藥水(Chloroxen)消毒土壤，或者其他藥劑蒸餾時，用PVC布不受腐蝕，而PVC布就受腐蝕。但墊洋菇床底之塑膠布，以PVC也就够了。

(二)床底用之塑膠布必需有通風孔，以保持堆肥之乾燥，外國用木箱栽培，其箱底是用木條釘成，有很多通風處，塑膠布若無通風孔，菇床多餘之水積蓄在床底，易引起嫌氣性細菌繁殖，有待洋菇生長。(杜自選)

### 瓊 蔴

瓊蔴鮮葉收購價  
百公斤十二—十四元

【問】：瓊蔴葉向何處工廠銷售？生葉每百公斤價格若干？此種纖維大多用於何種用途？(苗栗公館鄉中村一三三號郭煥章)

【答】：本省瓊蔴纖維，目前僅由各廠商及繩索地毯工廠，自行收購，貴地所採取之瓊蔴纖維可向竹南新興公司，或員林北斗小型麻工廠，洽請收購。目前市價，如用小型採織機所採乾纖維，每百斤約新臺幣二元六角。恒春瓊蔴產區，瓊蔴自動採織實驗中心，瓊蔴鮮葉按下列等級收購：

- 一級品：葉長九十五公分以上，病斑及傷斑葉不超過一%，每百公斤一十四元。
  - 二級品：葉長八十公分以上，病斑及傷斑葉不超過二·五%，每百公斤十三元。
  - 三級品：葉長六十五公分以上，病斑及傷斑葉不超過五%，每百公斤十二元。
- 瓊蔴纖維為海洋漁具繩索主要原料，尚

可供地毯、手提包及造紙等原料，目前本省瓊蔴纖維仍以製造繩索或纖維外銷日本等地為主。(賴銘立)

### 卉 花

虎尾蘭插葉選上年葉  
玫瑰扦插枝條不可過老

【問】：(一)虎尾蘭切葉扦插後二個多月，為何切口處只生短短的根，而不能發出根莖(地下莖)？又扦插後何時根莖才能生出？(二)唐蔦蒲的整塊，種植後有的枯死，是何原因？應用何方法能使整塊發芽生葉？晚香玉是否適於盆栽？

【答】：(一)玫瑰扦插是否會發根生長，插後為何都枯死？其繁殖能用扦插嗎？(彰化埤頭鄉永豐村東西路八三號)

【答】：(一)虎尾蘭用葉插時，其插穗應選較老而組織充實之葉，最好是上年所生葉，其長度為二十公分左右，則易於生根抽芽。扦插後三個月即可生出根莖。插後半年可以移植盆栽，春季扦插者秋季移植；秋季扦插者第二年春季移植。

(二)唐蔦蒲的球莖種植後枯死的原因，可能有：  
(1)球莖貯藏不當，如過濕過乾，或溫度過高等，或擱置太久，通常為一年。  
(2)球莖上附有病菌孢子或蟲卵，埋入土中發生嚴重之病蟲害。  
(3)意外之損傷。

應選組織充實，貯藏良好而健全之球莖，則易發芽生葉。大量栽培者求其發芽一律起見，播種前在攝氏十一—十五度溫度下冷藏一個月。

(四)晚香玉花莖較長，不適合盆栽。  
(四)玫瑰花可以用扦插法繁殖。所用之枝條過老者不易生根。春季扦插應選上年夏季抽出之枝條。秋季扦插，宜擇當年春季抽出之枝條。插穗長為十五公分左右。用很快的剪刀剪取，插前先用比插穗稍粗之竹桿，或木棍在苗床上先穿孔，後再插入並用手壓擠，使土與插穗密接，可吸水分而利生根。(呂淑濤)

## 小 麥 的 除 草

最老牌 最正確 最可靠 最效力宏大 最安心



### 由日本進口，原裝供應

※麥田除草一甲用藥量 300 公分，使用稀釋水量 600 公斤水 (即 2.000 倍水) 僅少化錢，最省錢省力，濶葉雜草立即枯死。  
※小麥下種後 25 日至 35 日之間，株高約達四英寸時使用為適期。

農藥登記證 346 號 商標註冊證 15695 · 15272 號

製造元 石原產業株式會社  
總代理 大豐農藥股份有限公司  
臺北市襄陽路 13 號三樓  
電話：37831 · 37858  
中部經銷處 臺灣吉本農化企業社  
臺中市柳川西路 152 號

## 種 品 新 良 優 項 各

收多·大快·腐耐·病耐  
培栽易容·良優質品

藤田交配	綠寶甘藍	長岡交配	早秋甘藍	長岡交配	サヲ夕白菜	濃紅鮮鮑	新黑田五寸人參	藤田	大五寸人參
------	------	------	------	------	-------	------	---------	----	-------

售分有均行子種大各省全  
種試願惠購向近就請啟

應供子種良優項各有備他其

街門西義嘉 行商和瑞周 理代總灣臺  
3479 話電

