

里鄉石牌村富北九號張瑞源)
【答】：(一)中國水產月刊現已發行一七八期，可向臺北市開封街一段三四巷六號中國水產協會訂購。

(二)鯉苗須向經銷商訂購，臺北縣士林鎮倫等里楊石城，及同縣觀音山下獅子頭林海子，均為鯉苗商，價格視體型大小而有不同，目前不詳。

(三)鯉魚飼養法，非三言兩語說得了，主要的如池水深三、四尺，水盪充沛，以免水質惡變，影響泛池，並有防逃設備，池底有軟泥尺許，大小魚分池放養，每日按時在投餌場給餌(餌料置於給餌籃內)，給餌應視當時鯉魚索食情形酌予增減，不可使用殘餘餌料，注意排水時，尤其在雨天，要注意逃逸。飼料一般用下什魚，近來亦有以專作養鯉用的人工混合飼料。

(四)鯉魚現在尚未到達人工繁殖階段。(五)目前有關鯉魚養殖資料不多，但鯉魚習性，晝伏夜出，嗜食動物性餌料，善逃亡，會自相殘食，故宜大小分養，並加防逃設備。(應德壽)

腰

腰果不適海邊種植

三年結果約十一公斤

【問】：(一)栽培腰果是否有經濟價值？每株結果最多與最少有幾磅？

(二)第三年開花結果，普通每株有幾磅？(三)腰果是否怕鹽分？如果在海邊種植，受海風、海霧吹擊，是否影響生長？(四)銨磷鉀施肥比例如何？每株每年應施多少？(五)四月開花，在六月結果，是否可靠？腰果是否不怕颱風？

(六)腰果能在乾燥與瘠薄地生產，如果在肥沃地種植是否更佳？(新竹市東南街四七之五號沈萬定)

【答】：(一)如能打開外銷市場，及將來在工業發展上有經濟價值。普通六、七年生約可收穫果十公斤，介壽果五十公斤，最少不一定。(二)第三年開花結果，其結果量常因氣候

及其他外界因子影響，故不能一定。普通可收穫果三至五公斤，介壽果五、六公斤。

(三)腰果怕鹽怕風，不宜海邊種植。

(四)銨磷鉀三要素比率為一比二比三，結果年齡在三至六年生，每株每年施混合肥料一、五至二公斤。七至九年生施二、五至三公斤。

(五)因受氣候影響，開花期遲早不一，腰果怕風，開花期遇颶風最為不利。

(六)腰果栽在肥沃土壤，當然生長更佳。(王兆全)

棗

棗子收穫後施有機肥

開花結果期施肥

【問】：(一)棗子開花後不結果，而整朵花變黑(如樣本)，是何原因？如何防治？(二)二十一棵中只有一棵不結果，其餘都能結果。

(三)棗子正在開花，有一部份已結果，近幾天發現有毛蟲，可不可以噴農藥？如可以，應噴何種農藥？(四)現一部份尚未結果，如要施肥可不可以？如不可以，則應於何時施用？(佳里鎮佳興園枝李忠立)

【答】：(一)印度棗初年開花，大多不能結果，主要原因為幼樹的花，發育多不正常，不能達成受粉作用，因此而脫落，這是正常現象，不必防治。另一原因與品種有關。凡低產量的品種，具有不能受粉的花數較多，所以落花落果的現象特別嚴重。

(二)開花期間最好不要噴射防蟲藥劑，如有必要時，最好噴佈馬拉松，因為馬拉松的殺蟲效力很好，而且毒性較低，影響較少。來信所說的毛蟲，可能是一種毒蛾的幼蟲，馬拉松非常有效。

(三)印度棗需在果實收穫後，施用一次有機肥料。如猪糞尿或雞糞等，促使產生新枝，並能在九、十月間開花結果。又在開花結果期間，施用化學肥料一次，促進果實發育，增加產量。肥料配合式可用八：八：十式。(張振甫)

正光化工股份有限公司

誠徵外務員啟事

- 一、高農畢業或有農藥外務經驗者。
二、役畢體健，年在30歲以下，對農藥外務工作有興趣者。
三、寄相片家庭概況表，履歷表寫明身高體重及希望待遇寄臺北市松江路61號。

東海牌動力噴霧、灌水兩用機


日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高

①附三馬力及馬力及馬力

②威力品

重量：17kg
噴霧每分：29公升
灌水每分：53公升



優點：

- ①24小時繼續使用不損機件。
②抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。



岡恒老牌

天下一品

赤白ビニール卷

現貨供應

總經理 新高貿易股份有限公司 臺北市峨眉街88號 電話：34190號