

洋 菇

洋菇床底墊布

可用PVC布

【問】：(一)百塑稀膠膠布(PVC)與布面出售之PVC塑膠布，有何不同？此布是否可用做洋菇床內襯？

【答】：(一)洋菇栽培床底內襯的塑膠布，是否必須打洞，如果不打洞，與外國淺箱式栽培有何異同？(二)雲林縣大埤鄉嘉興村八四號劉三慶

【答】：(一)PVC是“Polyethylene”的縮寫，PVC是Poly vinyl chloride 的縮寫，其化學組成當然有所不同，現在用最易了解的例子說明：如果你使用苦藥水(Chlorophenol)消毒土壤，或者其他藥水(Chlorophenol)消毒土壤，而PVC布就受腐蝕。但墊洋菇床底之塑膠布，以PVC也就够了。

(二)床底用之塑膠布必需有通風孔，以保持堆肥之乾燥，外國用木箱栽培，其箱底是用木條釘成，有很多通風處，塑膠布若無通風孔，菇床多餘之水積蓄在床底，易引起嫌氣性細菌繁殖，有待洋菇生長。(杜自選)

瓊麻鮮葉收購價

百公斤十二—十四元

【問】：瓊麻葉要向何處工廠銷售？生葉每百公斤價格若干？此種纖維大多用於何種用途？(苗栗公館鄉中村一三三號郭煥章)

【答】：本省瓊麻纖維，目前僅由各廠商及繩索地毯工廠，自行收購，貴地所採取之瓊麻纖維可向竹南新興公司，或員林北斗小型麻工廠，洽請收購。目前市價，如用小型採纖機所採纖維，每公斤約新臺幣二元六角。恒春瓊麻產區，瓊麻自動採纖實驗中心，瓊麻鮮葉按下列等級收購：

一級品：葉長九十五公分以上，病斑及傷斑葉不超過一%，每百公斤一十四元。
二級品：葉長八十公分以上，病斑及傷斑葉不超過二·五%，每百公斤十三元。
三級品：葉長六十五公分以上，病斑及傷斑葉不超過五%，每百公斤十二元。

瓊麻纖維為海洋漁具繩索主要原料，尚

可供地毯、手提包及造紙等原料，目前本省瓊麻纖維仍以製造繩索或纖維外銷日本等地為主。(賴銘立)

卉 花

虎尾蘭插葉選上年葉

玫瑰扦插枝條不可過老

【問】：(一)虎尾蘭切葉扦插後二個多月，為何切口處只生短短的根，而不能發出根莖(地下莖)？又扦插後何時根莖才能生出？自扦插後過多久才能移植盆中？

【答】：(一)唐葛蒲的整塊，種植後有的枯死，是何原因？應用何方法能使整塊發芽生葉？晚香玉是否適於盆栽？

【答】：(一)玫瑰扦插是否會發根生長，插後為何都枯死？其繁殖能用扦插嗎？(彰化埤頭鄉永豐村東西路八三號)

【答】：(一)虎尾蘭用葉插時，其插穗應選較老而組織充實之葉，最好是上年所生葉，其長度為二十公分左右，則易於生根抽芽。扦插後三個月即可生出根莖。插後半年可以移植盆栽，春季扦插者秋季移植；秋季扦插者第二年春季移植。

(二)唐葛蒲的球莖種植後枯死的原因，可能有下列：

(1)球莖貯藏不當，如過濕過乾，或溫度過高等，或擱置太久，通常為一年。
(2)球莖上附有病菌孢子或蟲卵，埋入土中發生嚴重之病蟲害。
(3)意外之損傷。

應選組織充實，貯藏良好而健全之球莖，則易發芽生葉。大量栽培者求其發芽一律起見，播種前在攝氏十一—十五度溫度下冷藏一個月。

(四)晚香玉花莖較長，不適合盆栽。

(四)玫瑰花可以用扦插法繁殖。所用之枝條過老者不易生根。春季扦插，宜擇當年春季抽出之枝條。插穗長為十五公分左右。用很快的剪刀剪取，插前先用比插穗稍粗之竹桿，或木棍在苗床上先穿孔，後再插入並用手壓擠，使土與插穗密接，可吸水分而利生根。(呂淑濤)

小 麥 的 除 草

最老牌 最正確 最可靠 最效力宏大 最安心

△石原 2,4-Dソーダ塩 除草劑

由日本進口，原裝供應

※麥田除草一甲用藥量 300 公分，使用稀釋水量600公斤水(即2,000倍水)僅少化錢，最省錢省力，潤葉雜草立即枯死。
※小麥下種後25日至35日之間，株高約達四臺寸時使用為適期。

農藥登記證346號 商標註冊證15695、15272號

製造元 石原産業株式會社
總代理 大豐農藥股份有限公司

臺北市襄陽路13號三樓
電話：37831、37858

中部經銷處 臺灣吉本農化企業社
臺中市柳川西路152號

種 品 新 良 優 項 各

收多·大快·腐耐·病耐
培栽易容·良優質品

藤田交配	綠寶甘藍	長岡交配	早秋甘藍	長岡交配	サヲタ白菜	濃紅鮮鮑	新黑田五寸人參	大五寸人參	藤田
------	------	------	------	------	-------	------	---------	-------	----

售分有均行子種大各省全
種試顧惠購向近就請敬

應供子種良優項各有備他其

街門西義嘉 行商和瑞周 理代總灣臺
3479 話電

