

臺南縣後壁鄉嘉田村十四號的賴丁出農友，自幼在家庭小康的農家長大，因受農業的薰陶，使他對農業發生興趣，所以在退伍返鄉後便利用自己的三分多土地，從事農業增產工作，向農業試驗所與改良場及農會等請教有關技術指導，從事木瓜栽培試驗的配育工作，結果育成矮生豐產的優良木瓜品種，現他願將自己所研究的木瓜栽培方法，提供給全省農友做參考，茲摘記其要點於左：

木瓜的播種及栽植適期：(一)在二月定植，本期可用於鳳梨園間作木瓜，或在能灌水的平地，於冬季春末播種時利用。(二)在十一、十二月播種。

木瓜的播種及栽植適期：(一)在二月定植，本期可用於鳳梨園間作木瓜，或在能灌水的平地，於冬季春末播種時利用。(二)在十一、十二月播種。

木瓜白粉病，可在九至五月間，每隔一、二個月使用殺也特徵粉可濕性粉劑泡水二百四十倍或用綠寶銅粉泡水一千倍來噴射防治，木瓜絕對不可用殺蟲劑巴拉松，以免發生藥害。

(農林廳林文進提供・好農家節目十一月廿日播出)

臺灣縣後壁鄉嘉田村十四號的賴丁出農友，自幼在家庭小康的農家長大，因受農業的薰陶，使他對農業發生興趣，所以在退伍返鄉後便利用自己的三分多土地，從事農業增產工作，向農業試驗所與改良場及農會等請教有關技術指導，從事木瓜栽培試驗的配育工作，結果育成矮生豐產的優良木瓜品種，現他願將自己所研究的木瓜栽培方法，提供給全省農友做參考，茲摘記其要點於左：

木瓜的播種及栽植適期：(一)在二月定植，本期可用於鳳梨園間作木瓜，或在能灌水的平地，於冬季春末播種時利用。(二)在十一、十二月播種。

木瓜白粉病，可在九至五月間，每隔一、二個月使用殺也特徵粉可濕性粉劑泡水二百四十倍或用綠寶銅粉泡水一千倍來噴射防治，木瓜絕對不可用殺蟲劑巴拉松，以免發生藥害。

(農林廳林文進提供・好農家節目十一月廿日播出)

矮生木瓜品種



農業廣播

，翌年一、二月定植，本播種法在本省中南部均可應用。

定植木瓜，如在排水良好的山地或平地就不必做畦，如在排水不良的平地，就要做成四十五公分高的畦或土堆，這樣可防雨季根腐發生，與延續樹齡，高畦栽培，基部主根常露出表面，可免數土。

木瓜栽培的增產要點，除了選擇優良品種外，須從改良栽培方面着手，為期能減低結果高度，於每年秋季採用主莖與地面成四十五度傾斜定植，同時注意根部向北，尾部向南，可減低風害，此時定植因係旱季，須注意灌水，等植株開花結果實後，在主幹四週覆蓋粗糠，可保持水分，使木瓜生長旺盛。除草在旱季每隔二三個月除一次，雨季每個月除一次，旱季灌水每隔十天至廿天灌一次。

木瓜定植成活後立即施肥，開花前採用環溝施肥法，肥料量每年每株不得少於一、五公斤，三要素的配合為硫安二十八%，過磷酸鈣六十%，氯化鉀十二%。每年分三、四次施用。每年每株施用十五公斤堆肥，如此可使木瓜連續收穫三、四年，每年每株產量在一百臺斤以上，植株過高時，可在離地面一公尺處砍斷，留二三芽，使其再開花結果實。

木瓜白粉病，可在九至五月間，每隔一、二個月使用殺也特徵粉可濕性粉劑泡水二百四十倍或用綠寶銅粉泡水一千倍來噴射防治，木瓜絕對不可用殺蟲劑巴拉松，以免發生藥害。

(農林廳林文進提供・好農家節目十一月廿日播出)

各項優良品種

收多・大快・腐耐・病耐
栽培易容・良優品質

藤	濃紅鮮艷	長岡交配	藤田交配
大	新黑	早	瑞和
五寸人參	田五寸人參	秋	優良品種
		甘	子
		白	
		菜	

售分有均行子種大各省全
種試顧惠購向近就請敬

應供子種良優項各有備他其


行商和瑞周 理代總理臺灣

西義嘉門
3479 話電

風行全世界！最新發育，育肥，促進劑！
貧血預防，育肥迅速增加體重劑

フェニトラン 肥豚樂針

(農畜字1012號)



- ①防止貧血引起的發育不良症。
- ②迅速增加體重30~50%。
- ③防止哺乳期間之下的痙攣與肺炎。
- ④改進體質而增加抵抗力。
- ⑤出生四日前後的小豬一隻一管(1cc)。

製造元：日本岩城製藥株式會社
總經銷處：臺灣總經銷處
地址：臺北市武昌街2段91巷1號
電話：36148

免費贈送「付二元郵票」博濟禽畜藥品手冊「內容豐富100頁各種疫病與各類新藥品之介紹」每人限一冊及康福利手冊最新新聞各一份。