

天，催它發芽。發芽後的種子，條播在苗床上，應設蔭棚，白天蓋上草蓋，遮斷強烈陽光直射，晚上取去草蓋，使露水能透入。管理上要非常週到細心，催芽種子的苗，才能育成。或在高山八月初育苗，九月初移植在平地亦可。

北部早期播種，亦有用催芽種子，直播覆草法，也能成功，但缺點是生育上不十分整齊。

### 育苗·條播施肥疏苗

結球萐苣種子細長扁平，一千粒重一·二一九公克。一公克種子約有八百二十粒，一磅種子有四十萬粒左右。種子表面雖光滑，但種子間相互粘着力很大。播種育苗時，最好混合細砂（乾砂）一、二倍，充分拌勻，而後均勻撒播在苗床或條播。但為管理方便計，最理想用一·二公寸行距條播。

苗床要選土質鬆疏肥沃，多孔性的砂質或腐植壤土。作一公尺二公寸寬的畦（包括畦溝），粉碎土壤，把預先做好的腐熟堆肥（不能用豬、牛糞尿和人糞尿作為堆肥材料，應採枯枝、落葉、雜草、豆餅或花生餅混合作堆肥，以保持苗床清潔。）薄敷苗圃一層，把土整平。

條播時，用一·二公寸行距的劃行器（見下圖），壓成淺溝，再將混合細砂的種子，均勻撒播在溝內，再覆腐熟堆肥一層後，畦面薄覆稻草，不要太厚，充分澆水，使它濕適。

以後每日早晚澆水一次，約經三四天，芽出土面，可把覆草抽出一半，其餘一半，移放在兩條行之間，不必拿去，可減少土面蒸發，並防雜草繁殖，如覆草不及時拿去，幼苗一經徒長，難得強健的苗。

播種育苗時，每十公畝需種子四十公克，直播栽培時，每十公畝需種子四百至五百公克。


不論條播或撒播育苗，要得健康整齊的苗，疏苗工作要分次進行，不能疎忽馬虎。第一次疏苗工作，待兩枚子葉長大，拔去集中在一處的苗。第二次真葉抽出一枚時，拔去較密集的苗。第三次待第二次真葉抽出時，使每株苗間隔相距○·二公分。

第三枚  
真葉抽  
出時，  
第四次  
疏苗，  
使每株  
苗間隔  
變成○·三  
○·四  
公分。

次疏苗  
後，用  
每

尿素三百倍水溶液作追肥施用。正常氣溫育苗日數約廿六天。有真葉四·五枚時，為最適移植日期。照上述方法育苗，不必進行假植。

如疏苗不勤，幼苗生長競爭結果，變成徒長軟弱苗，移植後容易倒伏，難求發育良好。育苗期間如有蟲害發生，應隨時注意防治。照此方法育苗和疏苗，苗床需要的面積，約為栽培面積二十分之一內外。



### 定植·整地寬行密植

美軍現在需要臺灣供應的清潔蔬菜，都有明文規定的標準規格限制。結球萐苣每株帶外葉三枚，每株小於二百五十五公分以下的，一概不要，以每株三百五十公分，為合適標準。栽培者要達到上項標準，必先把幼苗培育好，寬行密植，否則不合規格的結球萐苣大量生產，都不受歡迎。

要使每株結球萐苣都能達到三百五十公分的重量標準，第一，本由整地時，務使土壤均勻粉碎耙平，作成一公尺二公寸的畦面。每畦栽三行，行距四公寸，株距三·五公寸，每十公畝栽六十萬株。或一公尺畦面，栽二行，行距四·五公寸，株距三·五公寸，每十公畝栽五萬五千株。至於栽植深度，以剛埋沒苗根為準。

## 發財農藥

菇舍、鷄舍、田間野鼠及家鼠防治聖品！

## 殺鼠靈毒餌餅

低毒·安全·效果卓著!!

農藥登記證428號

■ 現貨供應

嘉泰企業股份有限公司 · 亞洲化學股份有限公司

臺北市仁愛路三段26號二樓

電話：76815