

高海拔地帶，排水良好的山麓地栽植，可不必作畦。平畦植，每隔四行空一行，留作走道。行距四公寸，株距三·五公寸。

施肥·鬆土追肥培土

定植前，作畦完畢，先把燐、鉀兩種肥料，每十公噸過磷酸鈣六十公斤，氯化鉀三十公斤混合後，全面撒施在畦面作基肥。如能加入豆餅粉，每十公噸五十公斤，混合全面作基肥更好。定植後七至十天，幼苗活著。淺鬆土後，第一次追肥用尿素兩百倍水溶液灌施。第二次追肥在第一次追肥後一星期，每十公噸用尿素十公斤或硫酸銨二十公斤，點施在株旁，距植株三分。淺鬆土時，覆蓋肥料。第三次追肥在定植後滿四星期，此時植株已有八至九枚木葉，根莖發達。先全面輕度鬆土，而後行間開溝溝。

每十公噸用尿素二十公斤或硫酸銨四十公斤，條施在行間，而後輕度培土，覆肥料。最後一次追肥，待開始結球前進行。依生育狀況，外葉展開，心葉有捲曲的形狀，決定肥料用量多少。一般用量和第三次追肥相同，施畢仍輕度培土，覆蓋肥料。

一般中等土壤，依據上述肥料用量，每十公噸施過磷酸鈣六十公斤，氯化鉀三十公斤，豆餅粉五十公斤作基肥外，追肥四次合計尿素五十公斤，或硫酸銨一百公斤，足夠維持充分發育生長。

管理：灌水防病除蟲


結球萐蕡生長迅速，需要水份亦多。自定植後，每次施肥輕度鬆土完畢，如天氣晴旱，好久不下雨，早晚應適度灌水，經常保持土壤潤濕，以利根羣發育。但因根部軟弱，灌水切勿太多，以免受損。

在平地冬春乾燥季節栽培，除北部地區陰濕外，中南部是乾季，灌水應特別注意。在高山地帶夏季多雨，無雨時，日照強烈，土面蒸發很大，栽植後，行間最好用草覆蓋。

平地冬春李栽培，在生育期間，葉面害蟲，除蚜蟲外，其他害蟲不易發生。在高山夏季栽培，夜盜蟲為害很厲害，尤其在春夏交接的四、五月間，成羣為害；蛞蝓在多濕氣候，容易發生。因結球萐蕡是生食蔬菜，防治害蟲，必須避免劇毒性的農藥，以低毒性農藥為宜。蚜蟲為害時，可用DDVP八百至一千倍。夜盜蟲為害時，噴射百分之一卅五「殺蟲淨」一千倍防除。蛞蝓可用Nametol誘殺劑誘殺。葉面不粘蟲糞，完整無缺，沒有一點蟲蛀跡象，在清潔檢查時，亦是重要規格之一，要特別注意。

病害中毒素病、菌核病、露菌病、褐斑病、斑點性細菌病，都在高溫多濕氣候中，常易發生。如有發現病株，應及早拔除，嚴防蚜蟲發生，以減輕毒素病的蔓延。雨前雨後，噴「鋅乃浦」可濕性粉劑四百倍稀釋液，預防斑點性細菌病、露菌病、褐斑病的發生。

速效·經濟·安全



本 廠 產 品		原 裝 進 口 品 名	
品 名	登記號碼	品 名	登記號碼
巴 拉 松	465	萬 能	856
馬 拉 松	474	地 特 靈	891
D D T	475	靈 丹	892
安 特 靈	598	阿 特 靈	952
菜 立 淨	673	新 紗 蟑 王	975
大 減 速	731	飛 佈 達	980
速 減	733	益 加 津	1146
克 蠼 一 號	790	飛 快 殺	1160
稻 保 生	791	吊 絲 蟲	1162
巴 力 多	793	蜘蛛 減	1164
紋 枯 減	800	八 卦 靈	1177

裕台企業股份有限公司農業化工廠
廠址：彰化市平和里五十號·電話三〇四四
總公司：台北市衡陽路六十四號