

採收：切口分級冷藏

結球莖苣，葉質脆嫩，容易破裂，生長至八分成熟，葉球緊密時，可開始採收。如待十分成熟，葉球堅硬時，很易裂球，且易發生葉燒病和軟腐病。採收時，平地冬春乾燥季節，選晴天的上午，俟露水乾後。高山夏季高溫季節，要選晴天的下午，雨天千萬不可採收。

把適宜收穫的葉球，連同外葉四、五枚，切取後，把切口朝上放在田間風乾。風乾時間，長距離運輸的，須經四、五小時，如短距離運輸的，只需風乾一、二小時即可。待切口風乾，再割去外葉，祇剩三枚，用小刀把切口修整削平，再層疊裝入簍中。切口向下，球面向上，不可擦傷葉柄，每簍以裝四十公斤為準，過多時葉球易被壓破裂。運到包裝場再分級。平地冬春季節生產，白天採收包裝運送，損耗不大。

高山夏季生產，下午採收包裝，應以夜間運送為宜，否則從高山到平地，氣溫驟降，極易變質腐爛，損耗很大。進包裝場後，不論冬季或夏季，為保持品質優良，應即時入攝氏十度的冷藏庫，以後再分級包裝出售。至於收量，如栽培得法，品種合適，每十公畝產量，平均在二千二百至二千五百公斤左右。

萬壽菊疏植摘要 細工播種宜砂土

杜廣
蛙

大輪萬壽菊含有機質之砂質壤土，行切花栽培而密植時（七×七寸距離），可不摘蕊。若株行距為一尺以上時，可於第六葉上方摘蕊，使生四、五主枝開花。若有腐熟堆肥，每百平方尺（一公畝）面積，應施用二百斤並加施過磷酸鈣二公升。定植後三週，再施硫酸銨五十公克，氯化鉀二公克，隨灌水施用，以後每隔三週施一次。

「貝細工」之播種，仍以砂土為佳，移植定植後則以粘質壤土發育良好。多年生草花有一特性，即幼苗階段，五、十對末葉時，需經過低溫（依種類不同，約五—十度。）約三週之時間。因此臺灣平地宿根多年生草花，多不易開花。

球根性多年生草花，如唐菖蒲、百合、水仙等，則有休眠性，打破休眠最好用冷藏法，約需五度，四十日左右。（以上溫度是攝氏）

貝細工之栽培與大輪萬壽菊相似。

洋種黃花、金盞花與大輪萬壽菊之土壤、摘蕊、施肥、管理、撒佈藥劑均可相似，多雨季節應注意防病措施。（臺中縣霧峯鄉彭舜容先生來信詢問萬壽菊與貝細工栽培，請參考。）

製配廠駐師技日本

中日合資

註冊



商標

三笠牌 農藥



成分準確
藥效確實
(均有合格登記證)

驅滅稻飛蟲速效藥

得力寶水和劑 50%
得力寶粉劑 1.5%

防除稻螟蟲特效藥

BHC粉劑 1.5%
BHC粉劑 3%

蓬萊種水稻
稻熱病防治最好藥劑
稻熱病石灰25 0.42%
美佳農錠0.625%
紋枯病防除特效
新安穗生液劑 6.5%
展着劑 滲展素
純中性洗劑 三笠F

台灣三笠化學工業股份有限公司
日本三笠化學工業株式會社 合資

彰化市大竹里大竹莊145號 電話2633號