



果樹

盧金剛果實

可留到三月

【問】：(一)新甜橙品種「盧金剛」與「鳳梨」橙苗何處有售？其收穫時期各在何時？每株收穫量多少？經濟價值怎樣？

【答】：(一)市面樹苗商所賣的所謂「八月橙桔」，收穫期是何時？那裡有苗出售？種植距離多少？多久能結果？產量與經濟價值如何？

【問】：(一)在木省何處有延種桶柑出售？價格大約多少？

【答】：(一)「盧金剛」熟期長，一月中旬即可供食，但掛留於樹上至三月間仍不凋落。八年生以上大株，每株可望一合斤以上之收穫量。「鳳梨」熟期為一月上旬至中旬。收穫量與「盧金剛」略同。上述品種由於目前真貨尚少，名聲尚未普遍化，商人常故意當「雪柑」而發價，價格不高。但一部份商人仍以美國新甜橙名義下出高價收購。去年收購價每合斤平均六、五、七元。純苗木可向嘉義縣番路鄉江雙村頂角仔二號「其成新果園」定購。苗木價格不詳，請直接函詢該苗圃。

【問】：(一)所謂「八月橙柑」，據聞係在霧峯鄉柑柑園中所發現之突變種。該品種未經調查及試驗，是否已固定之品種，其品質如何等問題均不詳，故無法奉告經濟價值。

【問】：(一)桶柑在北部繁殖之苗圃甚多，如「大春」、「大華」、「明茂」苗圃等。桶柑中種子較少之品系，即所謂「無籽桶柑」，在宜蘭縣頭城鎮新建里六號「新建苗圃」有繁殖，每株售價約為五元。

【問】：(一)楊桃之嫁接時期，在何月最適宜？

【答】：(一)楊桃之嫁接時期，除每年四至九月間樹幹塗剝地特靈外，如平時，噴藥時與巴拉松等混合噴布，防治此蟲是否也有效？

【問】：(一)楊桃嫁接最適時期為新曆一、二月。

【答】：(一)楊桃嫁接最適時期為新曆一、二月。

【問】：(一)荔枝蟲害以新枝及花序發生時期為最嚴重，可噴佈馬拉松及巴拉松等防治。結果期間則需每日噴佈「力拔山」或「賽文」，防治荔枝果實蛀蟲。木蠹蛾之為害，多在樹幹，宜每月噴佈地特靈一次。以地特靈混入巴拉松等藥來噴佈樹冠，並無必要，最好分別使用較妥。

【問】：(一)二年生荔枝如要施糞葉，最好在二、三月間施用，不必另加三要素化學肥料。五月以後，高溫多濕，如能每兩個月施用三要素化學肥料(五·九·一七)一次，生長必定旺盛。

【問】：(一)咖啡採收後需用脫肉機去果肉，然後堆置約廿小時，促使種殼表面所附之粘質發酵，再用清水洗淨，日晒約十天，令其充分

乾燥，然後貯藏。製粉時需先將種殼用脫殼機去除。所得種仁再入鍋焙炒，後再用磨粉機研粉。粉粒粗細，視用途而定，粉末適合泡，香氣容易保存，不宜外銷，粗粒適合煮(張振由)

菜蔬

抑制大蒜發芽用 M H  
提早收穫須低溫處理

【問】：栽培大蒜有幾點問題請教：  
(一)每分地須多少三要素，怎樣施用？  
(二)防治病蟲害用何藥品？  
(三)何種除草劑較宜施用？  
(四)生長時間頗長，約須一百五十天，才能採收，因會影響第一期耕作，有無促進早熟方法？

【答】：(一)每分地施用基肥為堆肥一千五百公斤，硫酸銨十公斤，過磷酸銨五十公斤，氯化鉀二十五公斤。追肥用尿素六十公

【問】：(一)蒜頭收穫前容易發芽，有無防止發芽法？(苗栗苑裡鎮上館里六——七三邱劉娘妹)

【答】：(一)蒜頭收穫前容易發芽，有無防止發芽法？(苗栗苑裡鎮上館里六——七三邱劉娘妹)

【問】：(一)蒜頭收穫前容易發芽，有無防止發芽法？(苗栗苑裡鎮上館里六——七三邱劉娘妹)

【答】：(一)蒜頭收穫前容易發芽，有無防止發芽法？(苗栗苑裡鎮上館里六——七三邱劉娘妹)

【問】：(一)蒜頭收穫前容易發芽，有無防止發芽法？(苗栗苑裡鎮上館里六——七三邱劉娘妹)

【答】：(一)蒜頭收穫前容易發芽，有無防止發芽法？(苗栗苑裡鎮上館里六——七三邱劉娘妹)

【問】：(一)蒜頭收穫前容易發芽，有無防止發芽法？(苗栗苑裡鎮上館里六——七三邱劉娘妹)

【答】：(一)蒜頭收穫前容易發芽，有無防止發芽法？(苗栗苑裡鎮上館里六——七三邱劉娘妹)


東海牌動力噴霧、灌水兩用機

日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高


- ① 三相馬力及馬力
- ② 噴霧機及噴霧機

重量：17kg  
噴霧量：每分升 29  
灌水：每分升 53



優點：

- ① 24小時繼續使用不損機件。
- ② 抽水可達達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
- ③ 用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
- ④ 本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。



岡恒老牌  
天下一品  
赤白ビニール卷  
現貨供應

總經理 新高貿易股份有限公司 臺北市峨眉街68號 電話：34190